

2023 年成人高等学校招生全国统一考试

医学综合(专升本)试题

题号	一	二	三	总分
得分				

得 分	评卷人

一、A 型题(1~44 小题,每小题 1.5 分;45~54 小题,每小题 2 分;共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。)

- 1.在腕部,临床常用触摸脉搏的动脉是()
- A.桡动脉B.尺动脉C.腋动脉D.肱动脉
- 2.腹腔内不成对脏器(肝除外)的静脉血直接汇入的静脉系是()
- A.上腔静脉系B.下腔静脉系C.心静脉系D.肝门静脉系
- 3.下列属于内耳的结构是()
- A.骨半规管B.咽鼓管C.乳突小房D.鼓室
- 4.损伤可能出现“垂腕”畸形的神经是()
- A.肌皮神经B.正中神经C.尺神经D.桡神经
- 5.大脑皮质书写区所在的部位是()
- A.额上回后部B.额中回后部C.额下回后部D.颞上回后部

- 6.下列属于成对脑颅骨的是()
- A.额骨B.筛骨C.蝶骨D.顶骨
- 7.十二指肠大乳头位于十二指肠的部位是()
- A.上部B.降部C.水平部D.升部
- 8.可封闭喉口,阻止食团误入喉腔的喉软骨是()
- A.甲状软骨B.会厌软骨C.杓状软骨D.环状软骨
- 9.通常精子与卵子结合的部位是()
- A.输卵管漏斗部B.输卵管子宫部C.输卵管壶腹部D.输卵管峡部
- 10.心脏正常的起搏点是()
- A.房室结B.窦房结C.房室束D.左、右束支
- 11.下列不属于小脑核的是()
- A.齿状核B.栓状核C.顶核D.疑核
- 12.关于局部电位的叙述,不正确的是()
- A.具有“全或无”特性B.可总和C.电位的幅度可大可小D.可作电紧张性扩布
- 13.心脏的前负荷是()
- A.大动脉血B.心室舒张末期容积C.心房收缩末期容积D.心室收缩末期容积
- 14.当动脉血压升高而其他因素不变时,心动周期中时间缩短的时相是()
- A.等容收缩期B.心室射血期C.等容舒张期D.心室充盈期

- 15.平静呼吸时,肺通气的原动力是()
- A.肺的舒缩运动 B.肺的弹性回缩
- C.呼吸肌的舒缩运动 D.胸内负压的周期性变化
- 16.关于体温生理变动的叙述,错误的是()
- A.女性体温低于男性体温 B.老年人体温略低
- C.育龄期女性体温随月经周期而变动 D.运动时体温升高
- 17.引起抗利尿激素分泌增多最敏感的因素是()
- A.循环血量增多 B.血浆晶体渗透压升高
- C.血浆胶体渗透压升高 D.动脉血压降低
- 18.视近物时,能使物像清晰地成像于视网膜上的决定因素是()
- A.瞳孔的大小 B.角膜的折光系数
- C.房水的折光系数 D.晶状体的弹性
- 19.非特异投射系统的主要功能是()
- A.引起特定感觉 B.维持大脑皮质兴奋状态
- C.调节内脏功能 D.维持睡眠
- 20.脊休克时,脊髓离断面以下反射消失的原因是()
- A.脊髓突然失去了高位中枢的调节 B.脊髓中的反射中枢被破坏
- C.切断的损伤刺激抑制了脊髓活动 D.缺血导致脊髓功能减退
- 21.在动物中脑上、下丘之间切断脑干,将出现的异常变化是()
- A.肢体麻痹 B.去大脑僵直
- C.脊休克 D.腱反射加强
- 22.幼年时缺乏甲状腺激素可出现的病症是()
- A.侏儒症 B.呆小症
- C.糖尿病 D.佝偻病
- 23.女,32岁。因下腹胀痛伴恶心、排尿不尽3天就诊。尿常规检查示:WBC 10~15/HP, RBC 3~5/HP,尿蛋白弱阳性。最可能的诊断是()
- A.急性肝炎 B.尿路结石
- C.急性膀胱炎 D.急性胃肠炎

- 24.男,18岁。打篮球时突发右侧胸痛伴胸闷、呼吸困难1小时急诊就诊。近年来身高增长较迅速。最可能出现的肺部体征是()
- A.双肺布满高调干鸣音 B.右侧肺语音震颤增强
- C.右侧肺底闻及湿啰音 D.右侧肺叩诊鼓音
- 25.女,62岁。吃红烧肉后出现阵发性右上腹及背部疼痛4天,1天来腹痛加重伴畏寒、发热。最可能出现的体征是()
- A.墨菲征阳性 B.胃泡鼓音区增大
- C.肋腰点压痛阳性 D.肝浊音界消失
- 26.女,28岁。服用过量安眠药物后出现意识障碍,被家人送至医院。查体:P 56次/分,R 12次/分,BP 110/60mmHg,压眶可被唤醒,答非所问,很快又再入睡。其意识障碍的程度是()
- A.昏迷 B.昏睡
- C.嗜睡 D.意识模糊
- 27.女,7岁。因剧烈头痛、呕吐、高热3天就诊。初步诊断脑膜炎。最可能出现的体征是()
- A.Hoffmann征阳性 B.Kernig征阳性
- C.Babinski征阳性 D.跟—膝—胫试验异常
- 28.女,52岁。咳嗽、咳痰20年。痰量多,静置后可出现分层现象。应首先考虑的诊断是()
- A.上呼吸道感染 B.肺结核
- C.支气管扩张症 D.慢性阻塞性肺疾病
- 29.男,3岁。进食时突发呼吸困难1小时。查体:口唇发绀,可见“三凹征”。最可能的诊断是()
- A.癔症 B.气管异物
- C.气胸 D.支气管哮喘
- 30.女,26岁。间断左下腹痛、腹泻、黏液脓血便2年,常于饮食不当后发作。导致腹泻最可能的病因是()
- A.肠易激综合征 B.慢性细菌性痢疾
- C.甲状腺功能亢进症 D.急性胃肠炎

- 31.女,19 岁。在公园赏花过程中突发咳嗽、喘息 1 小时。既往有吃鱼虾过敏史。最可能出现的肺部体征是()
- A.左侧肺叩诊呈鼓音 B.气管偏向一侧
- C.双肺闻及干啰音 D.右侧肺底闻及湿啰音
- 32.患者出现喷射状呕吐,应首先考虑的病症是()
- A.急性胃炎 B.幽门梗阻
- C.肾衰竭 D.颅内高压
- 33.女,31 岁。腹泻、易饥饿、体重减轻 3 个月,症状加重伴心悸 10 天就诊。心电图:P 波消失,代以小 f 波,RR 间期绝对不齐,QRS 波不宽。最可能的诊断是()
- A.甲状腺功能亢进症伴心房颤动 B.冠心病伴心房扑动
- C.糖尿病伴房室传导阻滞 D.电解质紊乱伴房性期前收缩
- 34.正常血钾浓度的范围为()
- A.2.5~3.5mmol/L B.2.5~3.5mg/L
- C.2.5~3.5μmol/L D.3.5~5.5mmol/L
- 35.最严重的输血并发症是()
- A.溶血反应 B.过敏反应
- C.细菌污染反应 D.发热反应
- 36.处理失血性休克,正确的做法是()
- A.应尽快止血,然后补充血容量 B.首先行根本的止血措施
- C.纠正休克后,才能施行手术止血 D.在补充血容量的同时,应尽快止血
- 37.失血性休克患者药物治疗首选的方案是()
- A.间羟胺 10mg 加入 5%葡萄糖液 100ml 静脉滴注
- B.西地兰 0.4mg 缓慢静脉注射
- C.快速滴入平衡盐溶液和人工胶体液
- D.甲泼尼龙 40mg 加入 5%葡萄糖液 100ml 静脉滴注
- 38.手术患者术前 12 小时禁食,4 小时禁水的理由是()
- A.让胃肠道适当休息 B.防止麻醉过程中引起窒息
- C.减少胃肠道手术时的污染 D.防止术后腹胀,早期恢复肠蠕动

- 39.心肺复苏中的首选药物是()
- A.肾上腺素 B.去甲肾上腺素
- C.异丙肾上腺素 D.利多卡因
- 40.肠内营养的常见并发症是()
- A.高脂血症 B.肝功能损害
- C.胆汁淤积 D.腹胀腹泻
- 41.中心静脉压直接反映的是()
- A.右心房压力 B.主动脉压力
- C.肺静脉压力 D.左心室压力
- 42.正常血浆渗透压的范围是()
- A.250~280mOsm/L B.280~310mOsm/L
- C.310~340mOsm/L D.340~370mOsm/L
- 43.腹股沟斜疝修补术后第 7 天拆线,切口轻度红肿。该切口愈合情况是()
- A.I/甲 B.Ⅱ/甲
- C.I/乙 D.I/丙
- 44.治疗下肢急性丹毒,首选的抗菌药物是()
- A.青霉素 B.红霉素
- C.庆大霉素 D.氯霉素

(45~47 题共用题干)

- 男,43 岁。因上腹隐痛半年就诊。查体时触及左锁骨上质地硬、活动度差的淋巴结。
- 45.应首先考虑的疾病是()
- A.慢性肝炎 B.消化性溃疡
- C.慢性胆囊炎 D.胃癌
- 46.支持上述诊断的重要病史是()
- A.腹痛向右侧肩背部放射 B.伴有呕吐及皮肤黄染
- C.腹痛多以夜间痛及饥饿痛为主 D.体重减轻,有肿瘤家族史
- 47.为明确诊断,最重要的辅助检查是()
- A.肝功能测定 B.腹部 B 超

C.胃镜及活检病理学检查 D.上消化道钡剂造影

(48~50 题共用题干)

男,78 岁。因夜间突发喘憋、咳痰、不能平卧 1 天急诊就诊。既往高血压病史 20 余年,未重视。初步诊断:高血压 3 级,急性左心衰竭。

48.该患者痰液性状最可能的是()

- A.铁锈色痰 B.金黄色痰
C.粉红色泡沫痰 D.黄绿色痰

49.叩诊时该患者最可能出现的心浊音界变化是()

- A.梨形心 B.靴形心
C.普大型心 D.三角形烧瓶样心

50.该患者心脏听诊最可能发现的体征是()

- A.奔马律 B.喀喇音
C.开瓣音 D.心包叩击音

(51~52 题共用题干)

男,36 岁。幽门梗阻伴严重呕吐 1 周。动脉血气分析 pH 和 HCO_3^- 明显增高。

51.患者最可能合并的水电解质紊乱是()

- A.低钾血症 B.低钠血症
C.高钾血症 D.高钠血症

52.目前最适合的补液选择是()

- A.5%葡萄糖液 B.10%葡萄糖液
C.5%碳酸氢钠 D.等渗盐水

(53~54 题共用题干)

男,64 岁。右小腿红肿伴发热 3 天。糖尿病病史 10 年。查体:右小腿内侧 $20\text{cm} \times 10\text{cm}$ 区域红肿,中间颜色稍淡,边界清楚,皮温高。

53.该患者最可能的诊断是()

- A.疖 B.急性蜂窝织炎
C.急性淋巴管炎 D.丹毒

54.该患者最可能感染的病原体是()

- A.金黄色葡萄球菌 B.大肠埃希菌
C.乙型溶血性链球菌 D.分枝杆菌

得 分	评卷人

二、B 型题(55~70 小题,每小题 1.5 分,共 24 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项,请从中选择一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。)

- A.镰状韧带 B.胃结肠韧带
C.肝圆韧带 D.肝胃韧带

55.属于小网膜的结构是()

56.属于大网膜的结构是()

- A.蝶筛隐窝 B.中鼻道
C.上鼻道 D.下鼻道

57.蝶窦的开口部位是()

58.额窦的开口部位是()

- A.红细胞 B.中性粒细胞
C.淋巴细胞 D.血小板

59.血液中具有吞噬细菌能力的细胞是()

60.血液中能够促进血液凝固的细胞是()

- A.每搏输出量 B.每分输出量
C.射血分数 D.心指数

61.一侧心室收缩一次射入动脉内的血量是()

62.搏出量占心室舒张末期容积的百分比是()

- A.蹒跚步态 B.剪刀步态
C.共济失调步态 D.慌张步态

63.帕金森病患者常见的步态是()

64.脑瘫患者常见的步态是()

- A.缺铁性贫血 B.久病衰弱
C.猩红热 D.水痘

65.草莓舌常见于()

66.镜面舌常见于()

- A.伤及表皮浅层 B.伤及肌腱骨骼
C.伤及生发层 D.伤及真皮乳头层以下,残留部分网状层

67.Ⅰ度烧伤的特点是()

68.深Ⅱ度烧伤的特点是()

- A.局部疼痛 B.发生转移
C.生长缓慢 D.合并出血

2023 年成人高等学校招生全国统一考试
医学综合(专升本)试题参考答案

一、A 型题

- 1.A 2.D 3.A 4.D 5.B 6.D 7.B 8.B 9.C 10.B
- 11.D 12.A 13.B 14.B 15.C 16.A 1 7.B 18.D 19.B 20.A
- 21.B 22.B 23.C 24.D 25.A 26.B 27.B 28.C 29.B 30.B
- 31.C 32.D 33.A 34.D 35.A 36.D 37.C 38.B 39.A 40.D
- 41.A 42.B 43.C 44.A 45.D 46.D 47.C 48.C 49.B 50.A
- 51.A 52.D 53.D 54.C

二、B 型题

- 55.D 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D 61.A 62.C 63.D 64.B
- 65.C 66.A 67.A 68.D 69.C 70.B

三、X 型题

- 71.ABC 72.ABD 73.ACD 74.ABC 75.ABD 76.AC 77.ABCD
- 78.ABD 79.ABC 80.ABD 81.ACD 82.ABC 83.ABC 84.ACD
- 85.ABCD 86.ABCD 87.ABCD 88.ABC 89.ABD 90.ABD

弥封线内不要答题