

医学综合模拟试卷(一)

题 号	一	二	三	总分	统分人签字
分 数					

得分	评卷人

一、A 型题：1～84 小题，在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 肋的组成，下列哪项是正确的 ()
 - A. 真肋 1～7 对肋，假肋 8～12 对肋，浮肋 11～12 对肋
 - B. 真肋 1～7 对肋，假肋 8～12 对肋
 - C. 真肋 1～8 对肋，假肋 9～12 对肋
 - D. 真肋 1～10 对肋，假肋 11～12 对肋
 - E. 真肋 1～5 对肋，假肋 6～10 对肋，浮肋 11～12 对肋 ()
2. 位于颅中窝的孔、裂是
 - A. 筛孔
 - B. 颈静脉孔
 - C. 舌下神经管内口
 - D. 切牙孔
 - E. 眶上裂 ()
3. 腹前外侧壁三块扁肌由浅至深依次是
 - A. 腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌
 - B. 腹外斜肌、腹横肌、腹内斜肌
 - C. 腹内斜肌、腹横肌、腹外斜肌
 - D. 腹横肌、腹外斜肌、腹内斜肌
 - E. 腹横肌、腹内斜肌、腹外斜肌 ()
4. 胃后壁相毗邻器官是
 - A. 膈、脾、胰、横结肠及其系膜
 - B. 膈、胰、脾、左肾及左肾上腺
 - C. 膈、脾、胰、左肾、横结肠及其系膜
 - D. 膈、脾、左肾及左肾上腺
 - E. 膈、脾、胰、左肾、左肾上腺和横结肠及其系膜 ()
5. 关于胆囊，下列说法中正确的是
 - A. 胆囊底的体表投影位于右腹直肌外缘与右肋弓相交处
 - B. 是腹膜内位器官
 - C. 分为底、体、颈、管四部
 - D. 能分泌胆汁和储存胆汁
 - E. 胆囊管与胰腺管汇合开口于十二指肠大乳头 ()
6. 气管杈位于
 - A. 右主支气管分支的分叉处
 - B. 左主支气管分支的分叉处
 - C. 肺叶支气管的分叉处
 - D. 第七气管软骨环
 - E. 气管分为左、右主支气管的分叉处 ()

7.心

- A.心底与膈相贴
- B.右心房、右心室位于左心房、左心室的右前方
- C.由左心室构成心尖
- D.由剑突左侧缘可摸到其搏动
- E.心尖位于剑突后方 ()

8.肾的被膜

- A.自内向外依次为肾纤维囊、肾脂肪囊,肾筋膜
- B.肾脂肪囊与浅筋膜的脂肪相连通
- C.肾筋膜是肾独立的被膜
- D.肾纤维囊紧贴肾实质,与之不易分离
- E.肾筋膜包裹肾整个外表面 ()

9.输尿管的行程

- A.行经腹横肌的前面
- B.行经腰方肌的前面
- C.左输尿管越过左髂内动脉起始部的前面
- D.在男性下端经精囊的后面穿入膀胱壁
- E.右输尿管越过右髂外动脉起始部的前面 ()

10.下列哪项不是精索的结构

- A.输精管
- B.射精管
- C.提睾肌
- D.睾丸动脉
- E.蔓状静脉丛 ()

11.有关卵巢的描述中错误的是

- A.其位置主要靠韧带维持
- B.性成熟期卵巢最大
- C.后缘中部有血管、神经等出入
- D.排卵可致卵巢表面形成瘢痕
- E.位于盆腔内,为实质性器官 ()

12.不属于颈外动脉的分支是

- A.甲状腺上动脉
- B.甲状腺下动脉
- C.面动脉
- D.舌动脉
- E.颞浅动脉 ()

13.当前臂出血时,常压迫哪一动脉暂时止血

- A.腋动脉
- B.肱动脉
- C.桡动脉
- D.尺动脉
- E.肱深动脉 ()

14.以下哪项是肠系膜下动脉的分支

- A.中结肠动脉
- B.乙状结肠动脉
- C.右结肠动脉
- D.直肠下动脉
- E.胰十二指肠下动脉 ()

15.眼球壁的中膜中最肥厚的部分

- A.虹膜
- B.睫状体
- C.脉络膜前部
- D.脉络膜中部
- E.脉络膜后部 ()

16.关于正中神经的叙述,下列哪项正确

- A.支配骨间肌
- B.支配全部蚓状肌

- C.经过肘窝、被肱三头肌腱覆盖 D.支配肱桡肌
E.由臂丛的内、外侧束的内、外侧根合成 ()
- 17.脊髓颈膨大
A.含神经纤维较多所致 B.主要颈部肌肉活动有关
C.平对第5颈椎体上缘至第1胸椎体下缘 D.发出的脊神经组成颈丛
E.位于脊髓第5颈节与第1胸节之间 ()
- 18.不属于间脑的结构是
A.上丘 B.底丘脑 C.上丘脑 D.下丘脑 E.背侧丘脑 ()
- 19.自中脑发出的神经
A.视神经 B.动眼神经 C.三叉神经 D.展神经 E.面神经 ()
- 20.在体表最易摸到的股动脉搏动的部位是
A.腹股沟韧带中、外1/3交点下方 B.腹股沟韧带中、内1/3交点下方
C.腹股沟韧带中点中侧 D.腹股沟韧带中点内侧
E.腹股沟韧带中点外侧 ()
- 21.甲状腺位于
A.甲状软骨上方 B.上达舌骨,下至第4气管软骨环
C.后方邻近食管 D.前方邻近颈阔肌
E.上达甲状软骨中部,下至第6气管软骨环 ()
- 22.判断组织兴奋性高低常用的指标是
A.阈电位 B.时值 C.阈强度
D.刺激强度相对时间的变化率 E.刺激的频率 ()
- 23.肌肉的初长度取决于
A.被动张力 B.前负荷 C.后负荷
D.前负荷与后负荷之和 E.前负荷与后负荷之差 ()
- 24.正常人血浆pH值为
A.6.35~6.45 B.7.05~7.15 C.7.35~7.45
D.7.65~7.75 E.8.35~8.45 ()
- 25.头面部痛、温觉的第一级神经元胞体位于
A.脊神经节 B.三叉神经节 C.三叉神经脊束核
D.三叉神经脑桥核 E.三叉神经中脑核 ()
- 26.正常人心率超过180次/min时,心输出量减少的原因主要是
A.快速充盈期缩短 B.减慢充盈期缩短 C.等容收缩期缩短
D.减慢射血期缩短 E.快速射血期缩短 ()
- 27.房室延搁的生理意义是
A.使心室肌不会产生完全强直收缩 B.增强心肌收缩力
C.使心室肌有效不应期延长 D.使心房、心室不会同时收缩
E.使心室肌动作电位幅度增加 ()
- 28.在下列哪种情况下,可使心输出量增加

- A.心迷走神经兴奋时 B.动脉血压升高时 C.由直立转为平卧时
D.颈动脉窦区血压升高时 E.心室舒张末期容积减小时 ()
- 29.呼吸频率从 12 次/min 增到 24 次/min,潮气量从 500ml,减少到 250ml,则
A.肺通气量增加 B.肺泡通气量增加 C.肺泡通气量不变
D.肺通气量减少 E.肺泡通气量减少 ()
- 30.在胰液中凝乳作用较强的酶是
A.胰脂肪酶 B.胰淀粉酶 C.胰蛋白酶
D.糜蛋白酶 E.羧基肽酶 ()
- 31.主动吸收胆盐和维生素 B_{12} 的部位是
A.十二指肠 B.空肠 C.回肠 D.结肠上段 E.结肠下段 ()
- 32.食物的氧热价是指
A.1 克食物氧化时所释放的能量
B.食物氧化时消耗 1 升氧时所能释放的所有能量
C.体外燃烧 1 克食物所释放的能量
D.氧化 1 克食物,消耗 1 升氧时所释放的全部能量
E.食物氧化时,消耗 1mol 氧时所释放的能量 ()
- 33.在近球小管中滤出的 HCO_3^- ,被重吸收的主要形式是
A. H_2CO_3 B. H^+ C. CO_2 D. HCO_3^- E. OH^- ()
- 34.用于测量肾血浆流量的物质是
A.尿素 B.肌酐 C.葡萄糖 D.碘锐特 E.菊酚 ()
- 35.在中枢神经系统内,神经元间兴奋的化学传递的下列特征中,哪一项是错误的
A.单向传递 B.不衰减 C.时间延搁
D.电化学反应 E.易疲劳 ()
- 36.M 受体
A.位于骨骼肌神经肌接头的肌膜上 B.位于植物神经节细胞膜上
C.可被酚妥拉明阻断 D.要被儿茶酚胺激活
E.位于植物性神经支配的效应器上 ()
- 37.维持躯体姿势的最基本的反射是
A.屈肌反射 B.对侧伸肌反射 C.腱反射
D.肌紧张反射 E.翻正反射 ()
- 38.交感神经兴奋时可引起
A.瞳孔缩小 B.逼尿肌收缩 C.消化道括约肌舒张
D.妊娠子宫收缩 E.支气管平滑肌收缩 ()
- 39.下列关于条件反射的生物学意义的叙述,哪项是错误的
A.后天形成,数量无限 B.具有极大的易变性
C.具有高度的适应性 D.可脱离非条件反射独立形成
E.条件反射建立的过程就是学习记忆的过程 ()
- 40.下列激素中哪一种不是腺垂体分泌的

- A.生长素 B.催产素 C.黄体生成素
D.促卵泡激素 E.催乳素 ()
- 41.劳动时人体的主要产热器官是
A.肺 B.心脏 C.肝
D.肾 E.骨骼肌 ()
- 42.血中哪一种激素出现高峰可作为排卵的标志
A.催乳素 B.卵泡刺激素 C.黄体生成素
D.催乳素释放因子 E.催乳素释放抑制因子 ()
- 43.有关问诊错误的是
A.最好病人自己叙述病史 B.态度要求亲切和蔼
C.先问病人容易回答的问题 D.边问边观察病人
E.对危重病人一定要详细询问和检查后再进行抢救 ()
- 44.引起发热最常见的原因是
A.抗原—抗体反应 B.无菌坏死物质的吸收 C.细菌感染
D.皮肤散热减少 E.体温调节中枢功能失常 ()
- 45.关于头痛的临床表现,下列哪项是正确的
A.急起的头痛伴发热者,常见于脑瘤 B.急性感染所致头痛位于后枕部
C.鼻源性头痛多为深在性 D.一般来说鼻源性头痛最剧烈
E.发热、脑瘤等可出现转动性头痛 ()
- 46.咳嗽、深呼吸时胸痛加重见于
A.自发性气胸 B.肺不张 C.肋间神经炎
D.心包炎 E.干性胸膜炎 ()
- 47.喷射性呕吐可见于
A.急性阑尾炎 B.急性胆囊炎 C.急性肝炎
D.脑膜炎 E.胃溃疡 ()
- 48.肉眼血尿是指每升尿内含血量超过
A.1ml B.2ml C.3ml D.4ml E.5ml ()
- 49.鲜血便一般来自
A.胃 B.空肠 C.十二指肠 D.直肠、肛门 E.食道 ()
- 50.黄疸是由于血液中总胆红素浓度超过
A.10mg/L B.20 mg/L C.30 mg/L
D.40 mg/L E.50 mg/L ()
- 51.有胸骨叩压痛特征的疾病是
A.肋间神经炎 B.肋软骨炎 C.白血病
D.胸壁软组织炎 E.肺炎 ()
- 52.一侧语颤减弱,呼吸音减弱,叩诊为实音,应考虑
A.胸腔积液 B.气胸 C.肺气肿
D.支气管炎 E.支气管扩张 ()

53. 细小支气管内有稀薄的液体分泌物,气流通过时所产生的音响称为
 A.大水泡音 B.中水泡音 C.小水泡音
 D.哮鸣音 E.哨笛音 ()
54. 窦性心动过缓每分钟心率少于
 A.60 次 B.40 次 C.50 次 D.30 次 E.55 次 ()
55. 胸骨左缘第 2 肋间触及连续性震颤见于下列哪种疾病
 A.主动脉瓣狭窄 B.二尖瓣狭窄 C.室间隔缺损
 D.二尖瓣关闭不全 E.动脉导管未闭 ()
56. 产生第一心音的主要机制是
 A.二尖瓣、三尖瓣开放 B.二尖瓣、三尖瓣关闭
 C.主动脉瓣、肺动脉瓣开放 D.主动脉瓣、肺动脉瓣关闭
 E.以上均不对 ()
57. 肝颈静脉回流征阳性可出现于下列哪些疾病
 A.肝硬化 B.高血压性心脏病 C.右心衰竭
 D.风心病二尖瓣狭窄 E.以上均对 ()
58. 关于腹部体检下列哪项是错误的
 A.振水音见于幽门梗阻 B.右肋下扣及肝脏提示肝肿大
 C.脾脏正常时不能扣及 D.肠鸣音消失可见于肠麻痹
 E.腹主动脉搏动在正常人也可触及 ()
59. 胆囊压痛点位于
 A.右肋缘下 B.剑突下 C.左肋缘下
 D.右侧腹直肌外缘与肋弓交界处 E.12 肋与脊柱交界处 ()
60. 病理反射的出现是由于
 A.脊髓反射弧的损害 B.神经系统兴奋性增高
 C.脑干网状结构损害 D.基底节受损
 E.锥体束受损 ()
61. 血小板计数的正常值为
 A.10—20 万 B.20—40 万 C.10—30 万
 D.20—50 万 E.10—50 万 ()
62. 周围血液酸性粒细胞增多常见于
 A.结核病 B.伤寒 C.严重细菌感染
 D.寄生虫病 E.风湿热 ()
63. 阿米巴痢疾患者大便常为
 A.鲜血便 B.果酱样便 C.黄色软便
 D.粘脓样便 E.洗肉水样便 ()
64. 腰椎穿刺术后,患者应去枕平卧
 A.1—3 小时 B.2—4 小时 C.3—5 小时
 D.4—6 小时 E.5—7 小时 ()

65. 细胞外液中最主要的阳离子是
A. Na^+ B. K^+ C. Ca^{2+} D. Mg^{2+} E. Fe^{2+} ()
66. 高渗性缺水时, 血钠浓度一般是
A. 大于 145 mmol/L B. 135—145 mmol/L C. 大于 135 mmol/L
D. 大于 125 mmol/L E. 以上都不对 ()
67. 休克时体液代谢改变的结果是
A. 血糖升高 B. 尿钠排出增多 C. 血清钾进入细胞内
D. 呼吸性酸中毒 E. 水分排出增多导致血容量进一步下降 ()
68. 休克致死的主要原因是
A. 血压显著降低 B. 尿量逐渐减少 C. 心功能不全
D. 肝功能衰竭 E. 微循环障碍, 致肺、肾、心、脑等脏器功能衰竭 ()
69. 有传染性的浅表化脓性感染是
A. 疖 B. 痈 C. 急性蜂窝织炎
D. 丹毒 E. 均无传染性 ()
70. 下列说法正确的是
A. 所有的疖均以局部治疗为主 B. 背部疖有脓栓时可挤出脓栓
C. 危险三角区的疖患者应联合用有效抗生素 D. 成人疖病只须应用抗生素
E. 以上都不对 ()
71. 有关丹毒, 错误的是
A. 是皮肤网状淋巴管的急性炎症, 无传染性 B. 致病菌为溶血性链球菌
C. 好发于下肢和面部 D. 很少有组织坏死或化脓
E. 区域淋巴结多肿大 ()
72. 三年前曾行破伤风自动免疫者, 受伤后应作下列哪项处理即可预防破伤风
A. 需再次注射破伤风类毒素 0.5 毫升
B. 需再次注射破伤风类毒素 5 毫升
C. 需再次注射破伤风抗毒素 1 500 国际单位
D. 需注射人体破伤风免疫球蛋白 3 000 国际单位
E. 严密观察, 暂不注射 ()
73. 长期服用肾上腺皮质激素的急症手术病人, 术前及术中应
A. 停用肾上腺皮质激素 B. 继续用肾上腺皮质激素 C. 药物减量
D. 可用可不用 E. 视病情而定 ()
74. 术后恶心、呕吐最常见的原因是
A. 精神因素 B. 颅内压增高 C. 麻醉反应
D. 水和电解质失衡 E. 胃管刺激咽部 ()
75. 输血后出现非溶血性发热反应最常见的原因是
A. 污染 B. 感染 C. 血液凝集 D. 致热源 E. 过敏反应 ()
76. 诊断急性肾衰, 最重要的实验室检查是
A. 血清钾 B. 血清钠 C. 血肌酐 D. 红细胞压积 E. CO_2CP ()

77. 下列哪项不是呼吸窘迫综合征初期的临床表现
 A. 呼吸加快 B. PaO_2 降至 8.0kPa
 C. X 线胸片一般无明显异常 D. 呼吸道分泌物增多, 肺部有啰音
 E. 呼吸窘迫感, 用一般的吸氧法不能得以缓解 ()
78. 要素饮食可能产生的代谢方面的合并症是
 A. 高钠、高氯 B. 氮质血症 C. 凝血酶原过低
 D. 高渗性非酮性昏迷 E. 以上都是 ()
79. 关于损伤止血, 下列哪一项是错误的
 A. 指压法仅用于短时间控制动脉血流 B. 指压法止血主要阻断毛细血管出血
 C. 压迫包扎法包扎要松紧适度 D. 手术止血法效果最为理想
 E. 填塞法止血的缺点是止血不够彻底 ()
80. 烧伤后败血症致病菌主要来源是
 A. 呼吸道 B. 肠道 C. 泌尿道 D. 创面 E. 输液管道 ()
81. 大面积烧伤现场急救时, 下列哪种情况最需要将气管切开后方可安全转院
 A. 呼吸道烧伤 B. 严重休克 C. 头面部烧伤
 D. 上呼吸道梗阻 E. 心搏骤停 ()
82. 关于皮脂腺囊肿与皮样囊肿, 下列哪项正确
 A. 皮脂腺囊肿简称皮样囊肿
 B. 皮脂腺囊肿是皮脂腺排出管阻塞所致
 C. 皮样囊肿是皮肤化脓感染引起
 D. 皮样囊肿与表面皮肤紧密相连, 无活动
 E. 皮脂腺囊肿与深层组织相连, 活动性大 ()
83. 恶性肿瘤的临床表现, 下列哪项是对的
 A. 局部不一定扪及肿块 B. 易出血和形成溃疡
 C. 可出现淋巴和血行转移 D. 消瘦、乏力、发热常为晚期表现
 E. 以上都对 ()
84. 心脏骤停一旦确诊, 应立即
 A. 尝试锤击复律及清理呼吸道 B. 气管内插管 C. 人工呼吸
 D. 口对口呼吸 E. 心脏按压 ()

得分	评卷人

二、B 型题: 85~108 小题。A、B、C、D、E 是其下题的备选项, 每小
 题只能从中选择一个最符合题目要求的, 每个选项可以被选择一
 次或两次。

- A. 由左、右肝管汇合而成 B. 由肝总管、胆囊管汇合而成
 C. 由肝管、胆囊管汇合而成 D. 由左、右肝管、胆囊、胆囊管汇合而成
 E. 由肝管、胆囊、胆囊管汇合而成
85. 肝总管是 ()
86. 胆总管是 ()

- A.奇静脉 B.脾静脉 C.肝静脉
D.左肾静脉 E.左髂内静脉
- 87.肝门静脉的属支是 ()
- 88.沟通上、下腔静脉的是 ()
- A.奇静脉 B.脾静脉 C.肝静脉
D.左肾静脉 E.左髂内静脉
- 89.注入下腔静脉的是 ()
- 90.左侧睾丸静脉注入 ()
- A.极化 B.去极化 C.复极化
D.超极化 E.反极化
- 91.细胞受刺激而兴奋时,膜内电位负值减小称做 ()
- 92.动作电位产生过程中, K^+ 外流增大出现 ()
- A.极化 B.去极化 C.复极化
D.超极化 E.反极化
- 93.安静时细胞膜两侧存在着正常数值的电位差称为 ()
- 94.动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为 ()
- A.以激素调节为主 B.以神经调节为主
C.以代谢物反馈调节为主 D.受靶腺激素与下丘脑调节肽双重调控
E.以自身调节为主
- 95.胰岛素分泌 ()
- 96.促甲状腺素分泌 ()
- A.回归热 B.波状热 C.弛张热 D.间歇热 E.不规则热
- 97.发热患者,体温急剧上升至 39°C 或以上,持续数天后又骤然下降至正常水平,高热期与无热期各持续若干天后规律性交替一次属于 ()
- 98.发热患者,高热期与无热期交替出现。体温波动幅度可达数度。高热时体温可达 39°C 以上,若干小时后降至正常,经一间歇时期(数小时或数天)后又突然升高属于 ()
- A.分层现象 B.铁锈色 C.粉红色 D.白色粘痰 E.棕红色
- 99.慢性支气管炎病人的痰常为 ()
- 100.肺梗死病人的痰常为 ()
- A.二尖瓣区吹风样收缩期杂音 B.主动脉瓣区喷射样收缩期杂音
C.肺动脉瓣区喷射样收缩期杂音 D.二尖瓣区隆隆样舒张期杂音
E. 动脉瓣区叹息样舒张期杂音
- 101.二尖瓣狭窄时听到的杂音 ()
- 102.主动脉瓣狭窄时听到的杂音 ()
- A.病毒感染 B.寄生虫病 C.结核病
D.应用肾上腺皮质激素后 E.淋巴细胞白血病
- 103.周围血液淋巴细胞减少见于 ()
- 104.周围血液酸性粒细胞增多症常见于 ()

- A.急性肠梗阻 B.感染性休克 C.肺炎高热
D.慢性十二指肠痿 E.挤压综合征

105.低渗性缺水的常见病因是 ()

106.代谢性酸中毒最易发生于 ()

- A.300 毫升 B.500 毫升 C.800 毫升 D.1 000 毫升 E.1 500 毫升

107.急性大出血超过多少时应及时输入全血 ()

108.失血量在多少毫升以内时,一般不需输血 ()

得分	评卷人

三、X 型题:109~120 小题,在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,至少有一项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。

109.参与构成小骨盆的结构有

- A.骶骨 B.骶结节韧带 C.骶棘韧带
D.坐骨结节 E.尾骨尖 ()

110.与胃后壁毗邻的器官有

- A.左肾上半部 B.胰 C.横结肠
D.脾 E.软腭 ()

111.小脑

- A.有上、中、下三对脚 B.深部有 4 对核团 C.构成第四脑室底
D.中间部称小脑蚓 E.功能主要与运动控制有关 ()

112.有关反射的各项叙述,正确的是

- A.反射必须通过中枢神经系统的作用 B.反射是神经调节的基本方式
C.完整的反射弧是完成反射的必要条件 D.腱反射不经过中枢神经系统
E.直接刺激坐骨神经引起腓肠的收缩是反射活动 ()

113.影响肾小球滤过的因素有

- A.滤过膜的通透性 B.肾血流量 C.有效滤过压
D.肾髓血流量 E.滤过膜的面积 ()

114.基础状态是指

- A.清晨、清醒 B.室温 20~25℃ C.静卧
D.禁食 4 小时 E.睡眠 ()

115.正常心脏相对浊音界正确的是

- A.左侧第 3 肋间距前正中线 3.5—4.5cm B.右侧第 4 肋间距前正中线 3—4cm
C.左侧第 5 肋间距前正中线 7—9cm D.右侧第 5 肋间距前正中线 5—6cm
E.以上均不正确 ()

116.肝浊音界下降见于

- A.气腹 B.肺气肿 C.肝硬化
D.右侧胸腔大量积液 E.肝脓肿 ()

117.尿胆红素阳性见于下列哪些疾病

- | | | | |
|-----------|---------|---------|-----|
| A.溶血性黄疸 | B.梗阻性黄疸 | C.药物性肝炎 | |
| D.急性病毒性肝炎 | E.急性胆囊炎 | | () |
- 118.休克代偿期微循环的变化有哪些
- | | | | |
|----------|----------|--------|-----|
| A.微血管收缩 | B.直捷通道开放 | C.血压不变 | |
| D.组织灌流减少 | E.脉压缩小 | | () |
- 119.下列哪些疾病的致病菌为链球菌
- | | | | |
|-----------|----------|--------|-----|
| A.亚急性心内膜炎 | B.丹毒 | C.淋巴管炎 | |
| D.急性骨髓炎 | E.急性蜂窝织炎 | | () |
- 120.临床判断烧伤的深度主要根据
- | | | | |
|----------|-------------|----------|-----|
| A.烧伤皮肤感觉 | B.是否出现水泡 | C.烧伤创面色泽 | |
| D.有无休克 | E.出现栓塞血管的形态 | | () |

医学综合模拟试卷(二)

题 号	一	二	三	总分	统分人签字
分 数					

得分	评卷人

一、A 型题：1～84 小题，在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1.关于脊柱的生理弯曲，正确的是

- A.颈曲后凸，胸曲前凸 B.颈曲前凸，胸曲后凸
C.颈曲前凸，胸曲前凸 D.骶曲前凸，腰曲前凸
E.腰曲后凸，胸曲前凸 ()

2.关于半月板的叙述，正确的是

- A.半月板外缘厚、内缘较薄 B.内侧半月板呈“O”形 C.内侧半月板较小
D.半月板周缘附于胫骨上 E.半月板的两端附着于股骨内外髁上 ()

3.参与构成踝关节的结构为

- A.胫、腓骨的下端和距骨滑车 B.胫、腓骨的下端和跟骨结节
C.胫、腓骨的下端和腓骨头 D.胫骨下端和距骨头
E.腓骨下端和距骨滑车 ()

4.属于椎体间的连结结构是

- A.项韧带 B.椎间盘 C.棘间韧带
D.黄韧带 E.棘上韧带 ()

5.肝十二指肠韧带中主要有

- A.下腔静脉、肝总管、门静脉 B.肝总管、肝动脉、门静脉
C.胆总管、肝固有动脉、门静脉 D.肝总管、肝丛、肝静脉、肝动脉
E.门静脉、胆总管、腹腔动脉 ()

6.腹膜的作用不包括

- A.分泌浆液 B.支持脏器 C.产生负压
D.修复损伤 E.吸收液体 ()

7.关于胸膜腔，下列说法正确的是

- A.内含空气，呈正压 B.其内有肺 C.与心包横窦相通
D.借膈主动脉裂孔与腹膜腔相通 E.下界在肩胛线上平第 11 肋 ()

8.关于肺的正确说法是

- A.左、右肺大小对称 B.位于胸膜腔内，纵隔两侧
C.左肺窄而长，有奇静脉的压迹 D.用力吸气时可充满肋膈隐窝

- E.纵膈面直对肺门 ()
- 9.中央旁小叶
- A.位于中央前回
- B.位于中央后回
- C.位于枕叶
- D.位于顶叶
- E.位于中央前回和后回上端的内侧面 ()
- 10.输尿管的三个狭窄,由起始端至末端依次为
- A.出肾门处、越小骨盆入口处、壁内段
- B.出肾门处、与髂血管交叉处、壁内段
- C.与肾盂移行处、与髂血管交叉处、壁内段
- D.与肾盂移行处、越小骨盆入口处、膀胱后部
- E.与肾盂移行处、与髂血管交叉处、膀胱后部 ()
- 11.睾丸的主要功能是
- A.产生精子 B.产生精液 C.产生精液与精子
- D.产生精液与分泌男性激素 E.产生精子与分泌男性激素 ()
- 12.下列哪项不是输卵管的分部
- A.子宫部 B.输卵管漏斗 C.输卵管壶腹
- D.输卵管伞 E.输卵管峡 ()
- 13.不参与心传导系统组成的是
- A.心房肌 B.房室结 C.窦房结
- D.房室束 E.左、右束支 ()
- 14.腹腔干的分支是
- A.肝总动脉 B.子宫动脉 C.肠系膜上动脉
- D.肠系膜下动脉 E.膀胱上动脉 ()
- 15.颈外静脉的属支是
- A.舌静脉 B.面静脉 C.咽静脉
- D.下颌后静脉 E.耳后静脉 ()
- 16.使眼球向外运动的肌肉
- A.上直肌 B.内直肌 C.下直肌
- D.上斜肌 E.下斜肌 ()
- 17.关于三叉神经的描述,下列哪项正确
- A.不支配咀嚼肌运动
- B.在脑桥下部脑桥臂下缘出脑
- C.含有特殊内脏传出纤维和一般躯体传入纤维
- D.含有内脏运动纤维
- E.传导舌后 1/3 的粘膜感觉和味觉 ()
- 18.头面部的痛、温和触觉传导通路的第 2 级神经元胞体

- A.发出纤维交叉后组成三叉丘系 B.发出纤维止于同侧腹内侧核
C.发出纤维形成对侧三叉神经脊束 D.发出纤维组成同侧三叉神经脊束
E.接受对侧三叉神经节细胞中枢突 ()
- 19.脊髓的被膜由外向内依次为
A.硬脊膜、蛛网膜、软脊膜 B.硬脊膜、软脊膜、蛛网膜
C.软脊膜、蛛网膜、硬脊膜 D.软脊膜、硬脊膜、蛛网膜
E.蛛网膜、硬脊膜、软脊膜 ()
- 20.感光最敏锐处是
A.视神经乳头 B.视网膜 C.黄斑
D.中央凹 E.眼球后极 ()
- 21.阑尾根部的体表投影在
A.脐与右髂前下棘连线的中、外 1/3 交点处
B.脐与左髂前上棘连线的中、外 1/3 交点处
C.脐与右髂前上棘连线的 1/3 处
D.左、右髂前上棘连线的 1/3 处
E.两侧髂前上棘连线的右、中 1/3 交界处 ()
- 22.以下关于可兴奋细胞动作电位的描述,正确的是
A.动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化
B.在动作电位的去极相,膜电位由内正外负变为内负外正
C.动作电位的大小不随刺激强度和传导距离而改变
D.动作电位的绝对值大小随刺激强度和传导距离而改变
E.不同的细胞,动作电位的幅值都相同 ()
- 23.神经-肌肉接头处传递中,消除乙酰胆碱的酶是
A.磷酸二酯酶 B.腺苷酸环化酶 C.胆碱酯酶
D.ATP 酶 E.胆碱乙酰化酶 ()
- 24.在下列白细胞中免疫细胞主要指
A.单核细胞 B.中性粒细胞 C.淋巴细胞
D.嗜酸性粒细胞 E.嗜碱性粒细胞 ()
- 25.凝血酶的主要作用是
A.激活因子Ⅻ B.分解纤维蛋白原
C.加速因子Ⅶ复合物的形成 D.加速凝血酶原复合物的形成
E.使因子Ⅷ的作用加强 ()
- 26.衡量心肌自律性高低的指标是
A.动作电位幅值 B.动作电位水平 C.最大复极电位水平
D.阈电位水平 E.4 期膜电位去极速率 ()
- 27.下列哪个因素不能使心输出量减少
A.迷走神经传出纤维兴奋 B.颈动脉窦内压升高
C.切断支配心脏的交感神经 D.增加心舒末期容积

- E.缺氧、酸中毒 ()
- 28.肺循环和体循环的
- A.收缩压相同 B.脉压相同 C.外周阻力相同
D.大动脉可扩张性相同 E.每搏输出量相同 ()
- 29.无效腔容量加倍时,肺通气/血流比值将
- A.加倍 B.减半 C.增大,但不到加倍
D.减小,但不到减半 E.不变 ()
- 30.胃的容受性扩张是通过下列哪一个途径实现的
- A.交感神经 B.迷走神经 C.壁内神经丛
D.抑胃肽 E.促胰液素 ()
- 31.对能量代谢影响最为显著的是
- A.寒冷 B.高温 C.肌肉运动
D.精神运动 E.进食 ()
- 32.临床用简便方法测定能量代谢率必须取得的数据是
- A.食物的热价 B.食物的氧热价 C.非蛋白呼吸商
D.一定时间内的耗氧量 E.一定时间内的二氧化碳产生量 ()
- 33.肾脏维持体内水平衡的功能,主要靠调节下列哪项活动来实现
- A.肾小球滤过量 B.近曲小管与髓祥的重吸收水量
C.远曲小管和集合管的重吸收水量 D.肾小管的分泌功能
E.近曲小管的重吸收水量 ()
- 34.哪段肾小管对 Cl^- 是继发性主动重吸收
- A.近球小管 B.髓祥降支细段 C.髓祥升支粗段
D.远曲小管 E.集合管 ()
- 35.突触前抑制的产生是由于
- A.突触前轴突末梢超极化 B.突触前轴突末梢释放兴奋性递质减少
C.突触后膜的兴奋性发生改变 D.突触前轴突末梢释放抑制递质
E.突触后神经元超极化 ()
- 36.交感神经节后纤维的递质是
- A.乙酰胆碱 B.去甲肾上腺素 C.5-羟色胺
D.多巴胺 E.去甲肾上腺素或乙酰胆碱 ()
- 37.能够造成细胞膜对 Na^+ 通透性突然增大的临界膜电位称为
- A.动作电位 B.阈电位 C.局部电位
D.静息电位 E.后电位 ()
- 38.副交感神经对代谢的影响是
- A.促进甲状旁腺素分泌 B.促进胰高血糖素分泌 C.促进糖原分解
D.促进胰岛素分泌 E.促进甲状腺素的释放 ()
- 39.人类区别于动物的主要特征是
- A.具有较强的适应环境的能力 B.具有非条件反射和条件反射

- C.具有第一信号系统
D.具有第一和第二两个信号系统
E.具有学习和记忆能力 ()
- 40.神经垂体激素是
A.催乳素与生长素
B.催产素与催乳素
C.加压素与催产素
D.抗利尿激素
E.催乳素与加压素 ()
- 41.机体保钠的主要激素是
A.抗利尿激素
B.生长素
C.氢化可的松
D.雌激素
E.醛固酮 ()
- 42.月经的发生是由于
A.雌激素急剧减少
B.孕激素急剧减少
C.雌激素与孕激素都急剧减少
D.前列腺素 $\text{PGF}_2\alpha$ 减少
E.催产素急剧减少 ()
- 43.发热伴黄疸常见于下列疾病,除了
A.重症肝炎
B.胆囊炎
C.流感
D.钩端螺旋体病
E.胆道蛔虫 ()
- 44.脑膜炎病人头痛的特点为
A.伴有发热、呕吐
B.伴有昏迷瘫痪
C.伴有视力障碍
D.间歇性头痛
E.跳动性头痛 ()
- 45.下列关于腹痛的论述不正确的是
A.胆囊炎时左上腹痛明显
B.胃穿孔后引起全腹痛,但上腹明显
C.阑尾炎时右下腹痛明显
D.心肌梗死时表现胸痛,不引起腹痛
E.尿路结石的腹痛常牵涉致下腹部及会阴部 ()
- 46.先天性心脏病引起的紫绀属于下列那种紫绀
A.中心性紫绀
B.周围性紫绀
C.肠源性紫绀
D.混合性紫绀
E.先天性紫绀 ()
- 47.脓血粘液便,脓多血少,多见于
A.阿米巴肠病
B.慢性结肠炎
C.伪膜性肠炎
D.细菌性痢疾
E.霍乱 ()
- 48.上消化道出血发现黑便,提示出血量至少是
A.30ml
B.40ml
C.50ml
D.60ml
E.70ml ()
- 49.昏迷病人口唇呈樱桃红色,常提示
A.一氧化碳中毒
B.有机磷农药中毒
C.亚硝酸盐类中毒
D.阿托品中毒
E.二氧化碳中毒 ()
- 50.检查发现患者胸廓的前后径等于横径,并伴有肋间隙增宽者,应考虑为
A.扁平胸
B.漏斗胸
C.鸡胸
D.佝偻病胸
E.桶状胸 ()
- 51.关于呼吸频率,下列哪一项是不正确的

- A.正常人静息状态下,呼吸频率为 16—18 次/分
 B.正常人呼吸与脉搏之比为 1:4
 C.呼吸频率超过 24 次/分,为呼吸过速
 D.呼吸频率低于 12 次/分,为呼吸过缓
 E.一般体温每升高 1℃,呼吸大约增加 5—6 次/分 ()
- 52.肺下界移动范围的最大部位是
 A.锁骨中线 B.两肋部 C.腋中线和腋后线
 D.腋前线 E.以上都不是 ()
- 53.关于肺泡呼吸音的阐述,下列哪项是不正确的
 A.正常人肺泡呼吸音的强弱与呼吸的深浅无关
 B.男性肺泡呼吸音较女性强
 C.儿童肺泡呼吸音较老年人强
 D.乳房下部及肩胛下部肺泡呼吸音最强
 E.肺尖及肺下缘区域肺泡呼吸音较弱 ()
- 54.湿啰音不出现于下列哪种疾病
 A.肺炎 B.肺结核 C.心功能不全
 D.肺不张 E.支气管肺炎 ()
- 55.下列哪项可引起心尖搏动增强
 A.甲状腺功能亢进及发热时 B.心肌梗塞 C.心包积液
 D.左侧胸腔积液 E.肺炎 ()
- 56.下列哪项不属于心脏听诊的内容
 A.心音附加音 B.心律 C.心杂音
 D.心包摩擦音 E.枪击音 ()
- 57.第二心音形成的主要机理是
 A.心房肌收缩 B.大血管内血液流动 C.二尖瓣开放
 D.三尖瓣开放 E.半月瓣关闭 ()
- 58.叹气样杂音见于下列哪种疾病
 A.二尖瓣狭窄 B.主动脉瓣狭窄 C.二尖瓣关闭不全
 D.主动脉瓣关闭不全 E.肺动脉瓣关闭不全 ()
- 59.反跳痛的发生机理是
 A.腹腔内有关炎症病灶 B.腹膜的壁层受炎症累及 C.腹腔内有出血
 D.腹膜的脏层受炎症累及 E.胃或肠穿孔 ()
- 60.既能屈髋又能伸膝的肌是
 A.股直肌 B.股薄肌 C.缝匠肌
 D.股内侧肌 E.肌中间肌 ()
- 61.膝腱反射的反射中枢位于
 A.腰髓 1—2 节 B.腰髓 2—4 节 C.腰髓 3—5 节
 D.骶髓 1—2 节 E.骶髓 2—4 节 ()

- 62.引起红细胞减少的因素不包括
 A.红细胞丢失过多 B.红细胞生成障碍 C.造血原料不足
 D.红细胞破坏增多 E.缺氧 ()
- 63.漏出液中以哪种细胞多见
 A.中性粒细胞 B.红细胞 C.嗜酸性粒细胞
 D.淋巴细胞 E.肿瘤细胞 ()
- 64.骨髓穿刺时,错误的是
 A.穿刺针进入骨质后不可摆动 B.抽吸骨髓量不可过多
 C.玻片必须干燥 D.抽出骨髓后,不可立即涂片
 E.涂片时要厚薄适宜 ()
- 65.血液正常 pH 值的范围是
 A.7.00—7.25 B.7.25—7.45 C.7.35—7.45
 D.7.15—7.45 E.7.45—7.55 ()
- 66.代谢性酸中毒最突出的临床表现是
 A.疲乏烦躁不安 B.呼吸深快,呼吸时带有酮味 C.嗜睡
 D.口唇樱红 E.血压不稳或下降 ()
- 67.休克病人采取何种体位最合理
 A.斜坡卧位 B.侧卧位 C.平卧位
 D.俯卧位 E.头低脚高位 ()
- 68.预防休克的关键是
 A.消除病因 B.保暖、防暑 C.穿抗休克裤
 D.注意休息 E.止痛剂早期应用 ()
- 69.关于外科感染,下列哪项不正确
 A.约占外科病的 1/3—1/2 B.疖、丹毒、急性阑尾炎等均属非特异性感染
 C.病程在 2 个月之内者均属急性感染 D.医院内感染的主要病菌是条件性病原菌
 E.外科感染病程中常发展为混合感染 ()
- 70.下列致病菌产生脓液无臭的是
 A.大肠杆菌 B.绿脓杆菌 C.变形杆菌
 D.类杆菌 E.均不正确 ()
- 71.下面有关外科感染问题,哪一项是错误的
 A.疖是毛囊与邻近的皮脂腺化脓感染 B.痈是多数散在,不相关连的疖病
 C.丹毒是皮内网状淋巴管的炎性病变 D.急性蜂窝组织炎是皮下结缔组织的感染
 E.脓肿是急性感染后局部脓液积聚 ()
- 72.破伤风潜伏期的错误说法是
 A.可在 24 小时以内 B.数周 C.平均 8—12(天)
 D.新生儿断脐后 7 日 E.潜伏期越短,病情越重 ()
- 73.术后(12—24)小时内发生的早期出血最可能的原因为
 A.血管结扎处出血坏死 B.感染后组织坏死 C.DIC

- D.血管结扎欠妥 E.以上均不是 ()
- 74.切口感染一般为术后多少天起切口疼痛加重,体温升高,伴切口处红肿脓性渗液
A.12 小时 B.24 小时 C.3 天 D.1 周 E.14 天 ()
- 75.输血的禁忌症应除哪项外
A.心力衰竭 B.肺水肿 C.红细胞增多症
D.严重感染 E.恶性高血压 ()
- 76.成人 24 小时尿量少于多少称无尿
A.50ml B.100 ml C.150 ml D.200 ml E.250 ml ()
- 77.急性肾衰无尿或少尿早期,发生水中毒常见原因是
A.低蛋白血症 B.内生水过多 C.抗利尿激素增加
D.钠潴留 E.不适当输入过多水分 ()
- 78.诊断急性呼吸窘迫综合征最重要的指征是
A.X 线胸片有广泛性点、片状阴影 B.心电图异常 C.肺部听诊有啰音
D.血气分析低氧血症 E.一般吸氧疗法无效 ()
- 79.颅脑损伤病人昏迷时间较长,营养疗法宜选用的补给途径是
A.口服 B.管饲 C.经周围静脉
D.经中心静脉 E.经周围小血管 ()
- 80.要素饮食的适应症是
A.消化道痿 B.严重烧伤和严重感染 C.坏死性胰腺炎
D.急性肾功能衰竭 E.肝功能衰竭 ()
- 81.创伤后应先修复的是
A.血管 B.神经 C.肌腱 D.关节韧带 E.骨 ()
- 82.暴露疗法适用于
A.III°烧伤 B.I°烧伤 C.深 III°烧伤 D.浅 II°烧伤 E.以上都是 ()
- 83.关于肿瘤叙述下列哪项是错误的
A.良性肿瘤呈膨胀性生长,可威胁生命
B.恶性肿瘤确切诊断依靠病理切片
C.良性肿瘤有包膜与周围组织分界明显
D.提高癌肿 5 年治愈率的关键是早期诊断
E.恶性肿瘤应根据年龄大小,决定切除范围 ()
- 84.抢救心跳、呼吸骤停者,应首先
A.气道通畅 B.口对口吹气 C.胸外心脏按压
D.胸内心脏按压 E.静脉注射肾上腺素 ()
- | | |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
| | |
- 二、B 型题:85~108 小题。A、B、C、D、E 是其下两小题的备选项,每小题只能从中选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。
- A.胰 B.膈 C.肾上腺 D.乙状结肠 E.十二指肠

- 85.左肾前方的毗邻有 ()
- 86.两肾后方的毗邻有 ()
- A.二尖瓣 B.三尖瓣 C.冠状窦 D.窦房结 E.房室结
- 87.位于冠状沟后部的结构是 ()
- 88.心的正常起搏点是 ()
- A.二尖瓣 B.三尖瓣 C.冠状窦 D.窦房结 E.房室结
- 89.能防止血液从左心室逆流至左心房的结构是 ()
- 90.能防止血液从右心室逆流至右心房的结构是 ()
- A.缝匠肌 B.股四头肌 C.大收肌 D.阔筋膜张肌 E.臀大肌
- 91.伸和外旋髋关节 ()
- 92.屈髋关节和膝关节并使膝关节旋内 ()
- A.脊髓 B.延髓 C.脑桥 D.中脑 E.下丘脑
- 93.体温调节中枢位于 ()
- 94.基本生命中枢位于 ()
- A.胸内压上升,跨壁压变小,呼吸道的管径扩大
- B.胸内压上升,跨壁压变小,呼吸道的管径变小
- C.胸内压下降,跨壁压变小,呼吸道的管径扩大
- D.胸内压下降,跨壁压变大,呼吸道的管径扩大
- E.胸内压下降,跨壁压变小,呼吸道的管径变小
- 95.吸气时 ()
- 96.呼气时 ()
- A.应激性胃溃疡 B.急性糜烂性胃炎 C.消化性溃疡
- D.胃底静脉曲张破裂出血 E.胆道出血
- 97.呕血前有慢性规律性上腹隐痛、返酸史 ()
- 98.呕血呈喷射状,血色鲜红,既往有黄疸或血吸虫病史 ()
- A.收缩压 <140 mmHg,舒张压 <90 mmHg
- B.收缩压是 $90-140$ mmHg,舒张压是 $60-90$ mmHg
- C.收缩压是 $95-160$ mmHg,舒张压是 $60-95$ mmHg
- D.收缩压 ≥ 160 mmHg,舒张压 ≥ 95 mmHg
- E.收缩压 ≥ 140 mmHg,舒张压 ≥ 90 mmHg
- 99.成人血压的正常值是 ()
- 100.高血压的诊断标准是 ()
- A.肠胀气 B.重症肌无力 C.急性腹膜炎
- D.结核性腹膜炎 E.慢性阑尾炎
- 101.板状腹可见于哪种疾病 ()
- 102.揉面感可见于哪种疾病 ()
- A.病理性多尿 B.暂时性多尿 C.肾前性少尿
- D.肾性少尿 E.肾后性少尿

- 103.尿崩症属于 ()
- 104.急性肾小球肾炎属于 ()
- A.3—3.5 mmol/L B.3.5—5 mmol/L C.3.5—5.5 mmol/L
- D.7.25—7.45 mmol/L E.7.35—7.45 mmol/L
- 105.正常血钾值的范围是多少 ()
- 106.血液正常 PH 值的范围是 ()
- A.切口分类及愈合记录为“Ⅰ甲” B.切口分类及愈合记录为“Ⅲ丙”
- C.切口分类及愈合记录为“Ⅱ甲” D.切口分类及愈合记录为“Ⅱ乙”
- E.切口分类及愈合记录为“Ⅲ甲”
- 107.腹股沟疝修补术,切口愈合良好 ()
- 108.右胫腓骨开放骨折,清创内固定后切口愈合良好 ()

得分	评卷人

三、X 型题:108~120 小题,在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,至少有一项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。

- 109.肺根内含有
- A.肺动脉 B.肺静脉 C.胸导管
- D.神经 E.主支气管 ()
- 110.在颅中窝内可见
- A.内耳门 B.破裂孔 C.棘孔
- D.眶上裂 E.颈静脉孔 ()
- 111.斜方肌起于
- A.上项线 B.枕外隆突 C.项韧带
- D.全部胸椎棘突 E.上半胸椎棘突 ()
- 112.心脏的泵血过程包括
- A.心房舒张期 B.等容收缩期 C.快速射血期
- D.快速舒张期 E.等容舒张期 ()
- 113.小肠是吸收的主要部位,因为
- A.小肠长达 5~6 米 B.食物在小肠内已加工成可吸收形式
- C.小肠粘膜上皮的吞噬作用强 D.食物在小肠内停留时间长
- E.小肠粘膜上有皱褶和绒毛 ()
- 114.影响冠脉循环的因素有
- A.腺苷 B.迷走神经 C.交感神经
- D.乳酸 E.CO₂ ()
- 115.符合干啰音特点的是
- A.吸气和呼气时都可听到 B.呼气时明显 C.部位比较固定
- D.多样性 E.持续时间较长,音调较高 ()

116.下列哪组搭配是正确的

- A.慢性胰腺炎—脂肪便 B.细菌性痢疾—脓血便 C.阻塞性黄疸—白陶土便
D.胃癌—鲜血便 E.上消化道出血—黑便 ()

117.心肌梗死的缺血型改变应该是

- A.T波升支与降支对称 B.T波由直立变为倒置 C.T波顶端尖耸
D.S—T段抬高 E.可出现病理性Q波或QS波 ()

118.手术前后,外科病人补充营养的选择宜是

- A.消化道功能正常者,以口服为主
B.昏迷或不能进食的病人可用管饲
C.结肠手术前准备和术后处理可用要素饮食
D.口服或管饲有困难或仍难提高营养者,可采用胃肠外营养
E.凡有部分消化道可被利用时,应试用要素饮食来代替胃肠外营养 ()

119.急性肾功能衰竭多尿期的主要并发症为

- A.低血钾 B.高血钾 C.感染
D.贫血 E.尿毒症 ()

120.恶性肿瘤的全身症状有

- A.早期无全身症状 B.晚期有消瘦、乏力、贫血等 C.最后出现恶病质
D.寒战高热 E.可有肿瘤副征出现 ()

医学综合模拟试卷(三)

题 号	一	二	三	总分	统分人签字
分 数					

得分	评卷人

一、A 型题:1~84 小题,在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 下列属于长骨的是
 - A. 胸骨
 - B. 髌骨
 - C. 肱骨
 - D. 肋骨
 - E. 足骨
 2. 关节辅助结构不包括
 - A. 关节盘
 - B. 关节唇
 - C. 关节囊
 - D. 滑膜囊
 - E. 滑膜褶
 3. 属于大腿肌肉内侧群的是
 - A. 股二头肌
 - B. 股薄肌
 - C. 半膜肌
 - D. 缝匠肌
 - E. 闭孔内肌
 4. 不属于下消化道的器官是
 - A. 十二指肠
 - B. 空肠
 - C. 回肠
 - D. 盲肠
 - E. 直肠
 5. 有关胸膜腔的描述错误的是
 - A. 腔内呈负压
 - B. 有少量浆液
 - C. 左、右胸膜腔不相通
 - D. 胸膜腔也称胸腔
 - E. 为潜在性的密闭腔隙
 6. 肾的被膜自外向内依次为
 - A. 肾脂肪囊,肾纤维囊,肾筋膜
 - B. 肾筋膜,肾脂肪囊,肾纤维囊
 - C. 肾纤维囊,肾脂肪囊,肾筋膜
 - D. 肾筋膜,肾纤维囊,肾脂肪囊
 - E. 肾脂肪囊,肾筋膜,肾纤维囊
 7. 输精管结扎的部位,通常位于
 - A. 睾丸部
 - B. 盆部
 - C. 精索部
 - D. 输精管壶腹
 - E. 腹股沟管部
 8. 卵巢与子宫角相连的韧带是
 - A. 卵巢系膜
 - B. 子宫阔韧带
 - C. 卵巢固有韧带
 - D. 子宫圆韧带
 - E. 卵巢悬韧带
 9. 静脉角位于
 - A. 颈内、外静脉汇合处
 - B. 左、右头臂静脉汇合处

- C. 锁骨下静脉与颈内静脉汇合处
D. 锁骨下静脉与颈外静脉汇合处
E. 以上都不是 ()
10. 心肌正常收缩的起搏点是
A. 窦房结 B. 房室结与房室束 C. 房室结
D. 窦房结与房室结 E. 房室束 ()
11. 属于右心室的结构是
A. 主动脉前庭 B. 动脉圆锥 C. 梳状肌
D. 卵圆窝 E. 冠状窦 ()
12. 不属于淋巴器官的结构是
A. 脾 B. 胸腺 C. 淋巴结
D. 腭扁桃体 E. 集合淋巴滤泡 ()
13. 看近物时,使晶状体变厚的主要原因是
A. 睫状小带紧张 B. 睫状肌紧张 C. 瞳孔括约肌舒张
D. 睫状环扩大 E. 瞳孔括约肌收缩 ()
14. 股四头肌
A. 股直肌起自髌前上棘 B. 止于胫骨粗隆 C. 能伸髋关节
D. 能屈膝关节 E. 受坐骨神经支配 ()
15. 关于脊神经哪项描述正确
A. 共有 30 对
B. 除胸 2~11 神经前支外,其余脊神经分别交织成丛
C. 后支只含躯体感觉纤维
D. 不管理脊髓被膜
E. 各前支均借灰、白交通支与交感干相连 ()
16. 骨髓穿刺的禁忌证为
A. 疑为血液病患者 B. 血小板明显减低者 C. 有出血倾向者
D. 严重的再生障碍性贫血 E. 血友病患者 ()
17. 关于三叉神经的正确说法是
A. 含有躯体运动纤维 B. 含有一般内脏感觉纤维
C. 含有特殊内脏感觉纤维 D. 含有特殊内脏运动纤维
E. 含有一般内脏运动纤维 ()
18. 成人脊髓下端平齐
A. 第 1 骶椎上缘 B. 第 2 腰椎下缘 C. 第 3 骶椎下缘
D. 第 1 腰椎下缘 E. 第 1 骶椎下缘 ()
19. 脑干内的内脏感觉核是
A. 三叉神经脊束核 B. 三叉神经脑桥核 C. 迷走神经背核
D. 孤束核 E. 疑核 ()
20. 何处损伤可伤及脊髓骶段
A. 第 1 腰椎 B. 第 1、2 骶椎 C. 第 2 腰椎

- D. 第3腰椎 E. 第5腰椎 ()
21. 下列描述面神经核正确的是
- A. 管理面部感觉和运动 B. 与唾液的分泌无关
C. 受损后,口角歪向患侧 D. 位于面神经丘内
E. 发出的纤维经乳孔出颅 ()
22. 人体生命活动最基本的特征是
- A. 物质代谢 B. 新陈代谢 C. 适应性
D. 应激性 E. 自控调节 ()
23. 下列哪种离子的膜内外浓度之比决定锋电位的高度
- A. K^+ B. Na^+ C. Ca^{2+}
D. Mg^{2+} E. Cl^- ()
24. 衡量兴奋性高低的指标是
- A. 动作电位 B. 锋电位 C. 阈电位
D. 阈强度 E. 刺激强度—时间变化率 ()
25. 血浆胶体渗透压的主要生理作用是
- A. 维持血细胞正常大小,形态及功能 B. 维持细胞内,外的水分布
C. 维持细胞正常体积 D. 维持细胞正常形态
E. 决定血浆的总渗透压 ()
26. 血凝块的回缩是由于
- A. 纤维蛋白收缩 B. 红细胞叠连 C. 白细胞变形
D. 血小板收缩蛋白收缩 E. 红细胞破裂 ()
27. 动脉血压升高可能引起
- A. 心室收缩期延长 B. 等容收缩相延长 C. 心室射血相延长
D. 心室舒张期延长 E. 心房收缩期延长 ()
28. 正常人心率超过180次/秒,心输出量减少的原因主要是
- A. 快速充盈期缩短 B. 等容收缩期缩短 C. 减慢射血期缩短
D. 快速射血期缩短 E. 减慢充盈期缩短 ()
29. 内呼吸是指
- A. 肺泡和肺毛细血管血液之间的气体交换
B. 组织细胞和组织细血管血液之间的气体交换
C. 线粒体内外的气体交换
D. 细胞器之间的气体交换
E. 组织细胞之间的气体交换 ()
30. 平静呼吸时胸膜腔内压的数值是
- A. 大气压—非弹性阻力 B. 大气压—弹性阻力
C. 大气压—肺表面张力 D. 大气压—肺回缩力
E. 大气压—肺弹性纤维回位力 ()
31. 下列哪种现象不是消化管平滑肌的一般生理特性

- A. 自动节律性 B. 富有伸展性 C. 较高兴奋性
D. 持续紧张性 E. 特异敏感性 ()
32. 下列物质中能对胃排空起抑制作用的是
A. 淀粉 B. 葡萄糖 C. 脂肪
D. 等渗溶液 E. 蛋白质消化产物 ()
33. 测定基础代谢率的条件,不正确的是
A. 静卧 B. 肌肉放松 C. 室温 20℃
D. 清醒 E. 餐后 2 小时 ()
34. 从生理学角度出发,体温是指
A. 口腔温度 B. 直肠温度 C. 腋窝温度
D. 身体深部的平均温度 E. 体表皮肤的平均温度 ()
35. 促进肾小球滤过的动力是
A. 肾小球毛细血管血压 B. 囊内液体胶体渗透压
C. 血浆胶体渗透压 D. 囊内压
E. 全身动脉压 ()
36. 血容量感受器兴奋可使
A. 抗利尿激素分泌增多 B. 抗利尿激素分泌减少
C. 醛固酮分泌增多 D. 醛固酮分泌减少
E. 抗利尿激素和醛固酮分泌都增加 ()
37. 在眼的折光系统中,折光力可被调节的结构是
A. 角膜 B. 房水 C. 晶状体
D. 玻璃体 E. 巩膜 ()
38. 关于神经纤维传导兴奋的叙述,哪一项是错误的
A. 结构的完整性 B. 功能的完整性 C. 单向传导
D. 相对不疲劳性 E. 绝缘性 ()
39. 人的小脑受损伤后,肌紧张会出现
A. 增强 B. 降低 C. 不变
D. 先增强,后降低 E. 先降低,后增强 ()
40. 震颤麻痹的主要症状包括
A. 黑质 B. 红核 C. 苍白球
D. 小脑 E. 丘脑底核 ()
41. 激素的作用是调节机体的
A. 代谢 B. 生长 C. 生殖
D. 发育 E. 以上全是 ()
42. 影响神经系统发育最重要的激素是
A. 糖皮质激素 B. 生长素 C. 甲状腺素
D. 胰岛素 E. 肾上腺素 ()
43. 患者因急性左心衰入院,既往有两次心肌梗死病史,关于心肌梗死的记录应放在

- A. 现病史中
B. 既往史中
C. 个人史中
D. 现病史中与既往史中都要记录
E. 不必记录 ()
44. 下列对体温的描述,哪项是不准确的
A. 1天内波动范围不超过 1°C
B. 口温一般在 37°C
C. 直肠温度比口腔温度高
D. 腋温 37.8°C 为低热
E. 腋温 40°C 为高热 ()
45. 持续性胸痛常由下列疾病引起,但除外
A. 肺炎
B. 急性心包炎
C. 心绞痛
D. 肺栓塞
E. 胸膜炎 ()
46. 全身性水肿的原因不包括
A. 心源性水肿
B. 肾源性水肿
C. 肝源性水肿
D. 营养不良性水肿
E. 下肢静脉血栓 ()
47. 咳嗽但无痰可见于
A. 急性支气管炎
B. 慢性支气管炎
C. 支气管扩张
D. 气胸
E. 支气管内膜结核 ()
48. 下列各项支持咯血诊断的是
A. 有心脏病史
B. 有肝硬化史
C. 经口腔排出
D. 颜色暗红
E. 酸性 ()
49. 下列哪项不属于肺源性呼吸困难
A. 胸腔积液
B. 支气管哮喘
C. 膈肌麻痹
D. 急性喉炎
E. 心包积液 ()
50. 病人处于持续睡眠状态,可被唤醒,但定向力差,其意识属于
A. 嗜睡
B. 轻度昏迷
C. 昏睡
D. 意识模糊
E. 中度昏迷 ()
51. 下列表现中能提示上消化道出血的是
A. 便血量多
B. 附着于粪便表面
C. 颜色鲜红
D. 柏油样便
E. 颜色暗红 ()
52. 下列哪项不是引起心悸的原因
A. 重度贫血
B. 发热伴心动过速
C. 完全性右束支传导阻滞
D. 窦房阻滞
E. 急性左心衰 ()
53. 男性,40岁,规律性上腹痛15年,2小时前餐后突感腹部剧痛,位置不固定,诊断首先考虑
A. 急性腹膜炎
B. 肠蛔虫症
C. 肠梗阻
D. 急性胃肠炎
E. 急性胆囊炎 ()
54. 周围性发绀可见于
A. 呼吸道阻塞
B. 肺淤血
C. 紫绀型先天性心脏病
D. 雷诺氏症
E. 肺纤维化 ()
55. 触诊对全身哪个部位的检查最重要

- A. 头颈部 B. 胸部 C. 腹部
D. 四肢 E. 皮肤 ()
56. 心脏杂音产生的原理不包括哪项
A. 瓣膜口狭窄 B. 心腔内漂浮物 C. 异常血流通道
D. 血流加速 E. 体位 ()
57. 鉴别肝病与心包疾患所引起的腹水,下列哪一个体检结果正确
A. 肝肿大 B. 脾肿大 C. 颈静脉怒张
D. 心界扩大 E. 下肢水肿 ()
58. 支气管呼吸音发生在何部位有病理意义
A. 喉头附近 B. 在正常肺泡呼吸音的部位
C. 在背部第 1、2 胸椎附近 D. 在背部第 6、7 颈椎附近
E. 胸骨上窝 ()
59. 强迫坐位见于
A. 胸膜炎 B. 腹泻 C. 急性肺水肿
D. 急性胆囊炎 E. 急性胃炎 ()
60. 肺泡呼吸音减弱或消失可见于
A. 剧烈运动 B. 贫血 C. 气管狭窄
D. 酸中毒 E. 高热 ()
61. 女性,45 岁,肝硬化病史 10 年,以大量腹水 3 月来诊,肝脾触诊应采用哪种方法
A. 双手触诊法 B. 钩指触诊法 C. 冲击触诊法
D. 滑动触诊法 E. 单手触诊法 ()
62. 严重肺气肿者的胸形态为
A. 扁平胸 B. 桶状胸 C. 串珠胸
D. 漏斗胸 E. 鸡胸 ()
63. 一患者胸骨右缘第 2 肋间触及收缩期震颤提示
A. 室间隔缺损 B. 动脉导管未闭 C. 肺动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣狭窄 E. 主动脉瓣关闭不全 ()
64. 全身肌肉松弛,对各种刺激全无反映,深浅反射均消失属于
A. 中度昏迷 B. 浅昏迷 C. 深度昏迷
D. 嗜睡 E. 昏睡 ()
65. 下列哪项不属于血常规检查
A. 红细胞计数 B. 血红蛋白测定 C. 白细胞计数
D. 白细胞分类 E. 血小板计数 ()
66. 下列哪种疾病可引起中性粒细胞减少
A. 慢性粒细胞性白血病 B. 尿毒症 C. 肺吸虫病
D. 脾功能亢进 E. 骨髓纤维化症 ()
67. 肝硬变放腹水时,一次放液不得超过
A. 1 000mL B. 2 000mL C. 3 000mL

- C. 疾病初期用肾上腺皮质激素以减轻炎症性渗出
D. 应用肝素治疗血管内凝血
E. 输入大量胶体液以维持正常血容量 ()
80. 开放性损伤不包括
A. 擦伤 B. 挫伤 C. 切伤
D. 裂伤 E. 皮肤脱伤 ()
81. 大面积烧伤休克的补液,通常按
A. II°烧伤的面积来计算补液量 B. III°烧伤的面积来计算补液量
C. I°烧伤的面积来计算补液量 D. I°和II°烧伤的面积来计算补液量
E. II°和III°烧伤的面积来计算补液量 ()
82. 下列哪一项不是良性肿瘤的特征是
A. 有包膜 B. 生长慢 C. 不转移
D. 浸润性生长 E. 细胞分化好 ()
83. 下列哪项不属于口对口人工呼吸的优点
A. 能保证充分的通气量 B. 若循环良好,能使动脉血气接近正常
C. 操作简单 D. 操作不易疲劳
E. 无特殊装置 ()
84. 必须优先抢救的急症有
A. 心搏骤停 B. 窒息 C. 大出血休克
D. 开放性气胸 E. 以上均是 ()

得分	评卷人

二、B型题:85~108 小题。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项,每小题只能从中选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 骨密质 B. 骨松质 C. 红骨髓
D. 黄骨髓 E. 骨膜
85. 位于椎体表面的是 ()
86. 肱骨近侧端骨松质内含有的是 ()
A. 第4颈椎下缘平面 B. 第6颈椎下缘平面
C. 第1胸椎下缘平面 D. 第2胸椎下缘平面
E. 第4胸椎下缘平面
87. 气管起始处为 ()
88. 气管分叉处为 ()
A. 节细胞 B. 后角固有核 C. 蜗神经核
D. 薄束核,楔束核 E. 三叉神经脊束核,三叉神经脑桥核
89. 视觉传导路第2级神经元胞体位于 ()
90. 听觉传导路第2级神经元胞体位于 ()
A. 感受器 B. 传入神经 C. 中枢

- D. 传出神经 E. 效应器
91. 皮肤黏膜的游离神经末梢属于 ()
92. 迷走神经在减压反射中属于 ()
- A. 壁细胞 B. 主细胞 C. 黏液细胞
- D. 幽门黏膜中 G 细胞 E. 胃黏膜表面上皮细胞
93. 分泌胃蛋白酶原的是 ()
94. 分泌内因子的是 ()
- A. 肾小球 B. 近球小体 C. 近球小管
- D. 髓袢 E. 远曲小管和集合管
95. 原尿生成的部位是 ()
96. 葡萄糖被重吸收的部位是 ()
- A. 昏睡 B. 意识模糊 C. 浅昏迷
- D. 深昏迷 E. 谵妄
97. 神志不清,呼之不应,角膜反射,对光发射存在考虑为 ()
98. 神志不清,出现错觉、幻觉、躁动不安、言语杂乱伴有定向力障碍应考虑为 ()
- A. 疼痛放射至左腰部 B. 疼痛放射至左上臂及前臂尺侧
- C. 疼痛放射至腹股沟 D. 疼痛放射至右肩部
- E. 疼痛放射至下腹部
99. 心绞痛 ()
100. 胆囊结石 ()
- A. 左侧卧位 B. 坐位前倾 C. 仰卧位
- D. 右侧卧位 E. 卧位或下蹲后迅速站立
101. 可引起二尖瓣狭窄杂音增强的是 ()
102. 可引起二尖瓣关闭不全杂音增强的是 ()
- A. 胸骨剑突 B. 髂前上棘 C. 腹直肌外缘
- D. 腹股沟韧带 E. 肋脊角
103. 腹部九区分法标志及常用骨髓穿刺部位 ()
104. 肾脏叩痛位置 ()
- A. 呼吸困难 B. 牙关紧闭 C. 喉痉挛
- D. 心动过速 E. 苦笑面容
105. 破伤风最早出现的症状是 ()
106. 破伤风最急的并发症 ()
- A. 非溶血性发热反应 B. 变态反应 C. 过敏反应
- D. 溶血反应 E. 细菌污染反应
107. 发生在输血后 1~2 小时内的是 ()
108. 输血时同时输入低渗液体时发生 ()

得分	评卷人

三、X 型题:109~120 小题,在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中至少有一项是符合题目要求的,多选或少选均不得分。

109. 运动时,减缓对关节冲击力的因素有
 A. 滑膜囊 B. 关节唇 C. 关节盘
 D. 关节半月板 E. 关节软骨 ()
110. 属于消化腺的是
 A. 肝 B. 脾 C. 胰
 D. 腮腺 E. 肾上腺 ()
111. 直接发自腹腔干的动脉是
 A. 胃左动脉 B. 胃右动脉 C. 肝总动脉
 D. 肝固有动脉 E. 脾动脉 ()
112. 属于顺电—化学梯度膜转运的形式有
 A. 单纯扩散 B. 主动转运 C. 易化扩散
 D. 胞吞作用 E. 胞吐作用 ()
113. 血小板的基本功能有
 A. 维持血管内皮细胞的完整性 B. 参与血液凝固
 C. 参与生理止血 D. 参与免疫作用
 E. 参与某些物质运输 ()
114. 促激素包括
 A. 促甲状腺激素 B. 黄体生成素 C. 促卵泡刺激素
 D. 促黑素 E. 促肾上腺皮质激素 ()
115. 谵妄的叙述正确的是
 A. 谵妄与抽搐相同 B. 定向力障碍 C. 躁动不安语言杂乱
 D. 有幻觉、错觉 E. 可见于感染高热,颠茄中毒,肝性脑病 ()
116. 心悸可由下列哪些原因引起
 A. 窦性心动过速 B. 高度房室传导阻滞
 C. 心房颤动 D. 单纯心肌收缩力增强
 E. 神经官能症 ()
117. 生命体征包括
 A. 意识 B. 体温 C. 脉搏
 D. 呼吸 E. 血压 ()
118. 骨髓穿刺检查可用于诊断
 A. 白血病与贫血 B. 骨髓瘤 C. 某些感染性疾病
 D. 黑热病 E. 原发性血小板减少性紫癜 ()
119. 良性肿瘤具有以下性质
 A. 细胞分化程度低 B. 呈膨胀性生长 C. 从不危及病人生命
 D. 无转移 E. 可恶变 ()
120. 低血钾诊断依据是
 A. 血钾小于 3.5mmol/L B. 软瘫 C. 心率失常
 D. 心电图 U 波出现 E. 心脏骤停 ()

医学综合模拟试题(四)

题 号	一	二	三	总分	统分人签字
分 数					

得分	评卷人

一、A 型题:1~84 小题,在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 所有椎骨都具有的结构是

- A. 棘突末端分叉 B. 横突上有横突孔 C. 椎体侧方有肋凹
D. 都有上下关节突 E. 横突 ()

2. 具有关节盘的关节是

- A. 颞下颌关节 B. 踝关节 C. 椎体间关节
D. 髋关节 E. 肩关节 ()

3. 使肩关节前屈的肌肉是

- A. 肱二头肌 B. 冈上肌 C. 冈下肌
D. 大圆肌 E. 肱肌 ()

4. 关于食管的说法,错误的是

- A. 分颈、胸、腹三部分 B. 具有三个狭窄 C. 被有腹膜
D. 受植物神经支配 E. 与胃的贲门相连 ()

5. 成年人喉的位置平对

- A. 第 2~4 颈椎体 B. 第 2~5 颈椎体 C. 第 3~5 颈椎体
D. 第 3~6 颈椎体 E. 第 5~6 颈椎体 ()

6. 关于膀胱的描述,正确的是

- A. 空虚时呈卵圆形 B. 膀胱尖朝向前下方 C. 膀胱为腹膜外位器官
D. 可分为尖、底、体、颈四部 E. 膀胱底朝向后下方呈倒置的三角形 ()

7. 不属于男性内生殖器的是

- A. 附睾 B. 输精管 C. 尿道
D. 前列腺 E. 阴囊 ()

8. 子宫

- A. 位于膀胱和阴道之间 B. 为腹膜间位器官 C. 与卵巢悬韧带相连
D. 子宫底高出小骨盆上口 E. 呈前倾后屈位 ()

9. 窦房结位于

- A. 房间隔下部的心内膜深面 B. 上腔静脉口前方的心内膜深面
C. 上腔静脉与右心耳交界处的心外膜深面 D. 下腔静脉入口处的心外膜深面

- E. 以上都不是 ()
10. 供应室间隔大部的动脉来自
A. 右冠状动脉主干 B. 右冠状动脉后室间支 C. 左冠状动脉前室间支
D. 左冠状动脉旋支 E. 左冠状动脉主干 ()
11. 血液不回流至肝门静脉的是
A. 胃 B. 小肠 C. 胰
D. 胆囊 E. 肝
12. 不注入胸导管的淋巴干是
A. 肠干 B. 左颈干 C. 左颈干
D. 左腰干 E. 右腰干 ()
13. 视网膜中感光最敏锐的部位是
A. 视神经盘的中央凹 B. 黄斑区的中央凹
C. 视神经盘与黄斑之间的中央凹 D. 黄斑的周围部分
E. 眼球的后级部分 ()
14. 开口于蝶筛隐窝的鼻旁窦是
A. 额窦 B. 蝶窦 C. 筛窦前群
D. 筛窦中群 E. 筛窦后群 ()
15. 以下的描述哪一项是正确的
A. 坐骨神经支配外展髋关节的肌 B. 臀下神经支配伸髋关节的肌
C. 闭孔神经支配髋关节旋内的肌 D. 腓浅神经支配足内翻的肌
E. 胫神经支配足背屈的肌 ()
16. 意识清醒的病人角膜反射消失,损伤可能在
A. 视神经或动眼神经 B. 动眼神经或面神经
C. 视神经或三叉神经 D. 面神经或三叉神经
E. 动眼神经或三叉神经 ()
17. 内脏大神经主要终于
A. 肠系膜上神经节 B. 肠系膜下神经节 C. 主动脉肾节
D. 腹腔神经节 E. 奇神经节 ()
18. 脊髓骶节
A. 有薄束和楔束 B. 有楔束无薄束 C. 没有皮质脊髓侧束
D. 没有皮质脊髓侧束 E. 有副交感神经节前神经元 ()
19. 脊髓后索受损时
A. 闭眼能确定关节的位置 B. 闭眼能指鼻准确
C. 闭眼能维持身体直立不摇晃 D. 受损的对侧有痛觉障碍
E. 闭眼不能确定各关节的位置 ()
20. 颅腔内听神经瘤最容易压迫的神经是
A. 三叉神经 B. 展神经 C. 面神经
D. 迷走神经 E. 舌咽神经 ()

21. 不与延髓相连的脑神经有
 A. 副神经 B. 舌咽神经 C. 迷走神经
 D. 三叉神经 E. 舌下神经 ()
22. 神经调节的基本方式是
 A. 反射 B. 反应 C. 神经冲动
 D. 正反馈调节 E. 负反馈调节 ()
23. 人体内以单纯扩散方式跨膜转运的物质是
 A. Na^+ B. Ca^{2+} C. O_2 和 CO_2
 D. 葡萄糖 E. 氨基酸 ()
24. 能引起细胞产生动作电位所需要的最小刺激强度称为
 A. 时值 B. 最小刺激 C. 阈强度
 D. 阈电位 E. 基强度 ()
25. 红细胞悬浮稳定性差会导致
 A. 溶血 B. 凝集 C. 凝固
 D. 血沉加快 E. 出血时延长 ()
26. 交叉配血试验的主侧是
 A. 供血者红细胞与标准血清相混合
 B. 供血者的红细胞与受血者的血清相混合
 C. 供血者红细胞与给血者的血清相混合
 D. 供血者的血清与标准血清相混合
 E. 供血者的血清与受血者的红细胞相混合 ()
27. 下列能引起期前收缩的时期是
 A. 绝对不应期 B. 局部反应期 C. 收缩期
 D. 舒张早期 E. 相对不应期 ()
28. 心机的等长自身调节通过改变下列哪个因素调节心脏的泵血功能
 A. 肌小节初长 B. 肌钙蛋白活性 C. 肌浆游离 Ca^{2+} 浓度
 D. 心肌收缩能力 E. 横桥 ATP 酶活性 ()
29. 下列情况下,能使脉压增大的因素是
 A. 射血期延长 B. 外周阻力增大 C. 心率增快
 D. 体循环平均充盈压降低 E. 大动脉管壁弹性降低 ()
30. 肺通气的原动力来自
 A. 肺内压与胸内压之差 B. 肺内压与大气压之差
 C. 肺的弹性回缩 D. 呼吸肌舒缩运动
 E. 肺内压周期性变化 ()
31. 关于 CO 中毒的描述,错误的是
 A. Hb 与 CO 的亲合力比 O_2 大 280 倍
 B. Hb 与 CO 结合生成 HbCO
 C. CO 中毒后病人出现严重缺氧,表现发绀

- D. CO 与 Hb 结合后,可阻止 HbO₂ 的解离
 E. CO 与 Hb 结合后,使 Hb 失去携带 O₂ 的能力 ()
32. 化学性消化的作用是
 A. 食物由大变小 B. 食糜与消化液混合
 C. 将食物分解成可被吸收的成分 D. 推动食糜沿消化管不断移动
 E. 以上均不是 ()
33. 关于胃肠激素的描述,哪一项是错误的
 A. 由散在于黏膜层的内分泌细胞分泌
 B. 均为肽类激素
 C. 仅存在于胃肠道
 D. 可调节消化管的运动和消化腺的分泌
 E. 有些胃肠激素具有营养作用 ()
34. 安静时,人体的主要产热器官是
 A. 骨骼肌 B. 皮肤 C. 粘膜 D. 内脏 E. 脑 ()
35. 肾脏对葡萄糖的重吸收发生在
 A. 近球小管 B. 髓袢 C. 远球小管
 D. 集合管 E. 各段肾小管 ()
36. 盆神经受损时,排尿功能障碍的表现是
 A. 尿失禁 B. 尿频 C. 尿潴留
 D. 多尿 E. 少尿 ()
37. 与声波传导和感受无直接关系的结构是
 A. 鼓膜 B. 基底膜 C. 听骨链 D. 毛细胞 E. 咽鼓管 ()
38. 神经冲动抵达末梢时,引起递质释放主要有赖于哪种离子的作用
 A. Cl⁻ B. Ca²⁺ C. Mg²⁺ D. Na⁺ E. K⁺ ()
39. 突触后抑制时,下列哪种情况不会出现
 A. 突触前膜释放神经递质 B. 突触后膜 Cl⁻ 内流 C. 突触后膜超极
 D. 兴奋性突触后电位 E. 突触后膜的兴奋性降低 ()
40. 维持躯体姿势的最基本的反射是
 A. 屈肌反射 B. 肌紧张 C. 对侧伸肌反射
 D. 翻正反射 E. 腱反射 ()
41. 不是肾上腺皮质分泌的是
 A. 皮质醇 B. 醛固酮 C. 性激素
 D. 肾上腺素 E. 盐皮质激素 ()
42. 糖皮质激素分泌的调节主要是通过
 A. 交感神经 B. 副交感神经 C. 下丘脑—腺垂体系统
 D. 自身调节 E. 促肾上腺皮质激素释放激素 ()
43. 下列哪些不属于既往史
 A. 出生地 B. 留居地 C. 工作条件

- D. 子女数目 E. 业余爱好 ()
44. 大叶性肺炎的典型热型为
A. 稽留热 B. 弛张热 C. 间歇热
D. 回归热 E. 波状热 ()
45. 下列哪项是引起头痛的颅内病变
A. 颅骨肿瘤 B. 肺性脑病 C. 脑肿瘤
D. 三叉神经痛 E. 颈椎病 ()
46. 可直接导致意识障碍的心律失常是
A. 房性早搏 B. 室性早搏 C. 心室颤动
D. 右束支传导阻滞 E. 窦性心动过速
47. 呼吸困难时出现的三凹征是指
A. 胸骨上窝、锁骨下窝、肋间隙明显下陷
B. 胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显下陷
C. 胸骨上窝、双侧锁骨上窝明显下陷
D. 胸骨上窝、双侧锁骨下窝明显下陷
E. 双侧锁骨上窝、肋间隙明显下陷 ()
48. 中心性发绀见于
A. 肺源性心脏病 B. 失血性休克 C. 药物中毒
D. 右心衰竭 E. 慢性缩窄性心包炎 ()
49. 下列便血患者中,能提示结肠癌的是
A. 伴发热 B. 伴消瘦 C. 伴腹痛
D. 伴黑便 E. 伴腹部肿块 ()
50. 中输尿管点的位置是在
A. 髂前上棘水平腹直肌外缘 B. 脐水平线上腹直肌外缘
C. 腹直肌外缘与肋弓交点 D. 脐与髂前上棘连线的中外 1/3 点
E. 耻骨联合上 ()
51. 检查腹水患者肝脏肿大情况应采用
A. 浅部触诊法 B. 深压触诊法 C. 双手触诊法
D. 冲击触诊法 E. 深部滑行触诊法 ()
52. 正常人血压,下列哪项是错误的
A. 晚上和劳动后较高 B. 寒冷环境中较低 C. 饱餐饮酒后较高
D. 晨起血压较低 E. 以上均不对 ()
53. “风心”二尖瓣狭窄患者可出现的面容是
A. 面圆如满月,皮肤发红 B. 面色苍白,浮肿,脸厚而宽
C. 面色晦暗,双颊紫红,口唇微绀 D. 面容惊愕,眼球突出
E. 牙关紧闭,面肌痉挛,成苦笑状 ()
54. 第一心音产生是由于
A. 舒张早期血流冲入心室引起心室壁的震动

- B. 二、三尖瓣关闭时瓣叶紧张度突然增强产生的震动
C. 二、三类瓣开放
D. 心室舒张受限产生震动
E. 主动脉瓣和肺动脉瓣关闭不同步所致 ()
55. 淋巴细胞增多见于
A. 病毒感染 B. 寄生虫感染 C. 放射病
D. 丙种球蛋白缺乏症 E. 化脓菌感染 ()
56. 某些患者尿液有灰白色沉淀,加酸后沉淀物溶解并产生气泡,应考虑
A. 尿酸盐结晶 B. 磷酸盐结晶 C. 碳酸盐结晶
D. 草酸钙结晶 E. 磷酸钙结晶 ()
57. 持续性胸痛常由下列疾病引起,但除外
A. 心绞痛 B. 肺栓塞 C. 胸膜炎
D. 肺炎 E. 急性心包炎 ()
58. 关于肺源性呼吸困难的机制,哪项是错误的
A. 肺通气/换气功能障碍 B. 肺泡氧分压下降 C. 有低氧血症
D. 有高碳酸血症 E. 呼吸中枢受到抑制 ()
59. 霍乱引起的腹泻属于
A. 分泌性腹泻 B. 渗出性腹泻 C. 渗透性腹泻
D. 动力性腹泻 E. 吸收不良性腹泻 ()
60. 检查肾脏最适宜的触诊方法是
A. 浅部触诊法 B. 深部滑行触诊法 C. 双手触诊法
D. 深压触诊法 E. 冲击触诊法 ()
61. 下列哪项不属于肾前性少尿
A. 休克 B. 脱水 C. 右心衰
D. 糖尿病肾病 E. 肾动脉狭窄 ()
62. 支气管扩张伴有咯血的病人,听诊吸气早期最常见的体征为下列哪一项
A. 大水泡音 B. 小水泡音 C. 捻发音
D. 哨笛音 E. 鼾音 ()
63. 下列体征除哪一项外均可由腹膜炎引起
A. 反跳痛 B. 叩击痛 C. 肌紧张
D. 腹肌自主强直 E. 压痛 ()
64. 湿啰音特点,不包括下列哪一项
A. 性质如水泡破裂声 B. 部位较恒定 C. 性质不变
D. 咳嗽后可消失 E. 呼气末明显 ()
65. 胸腔穿刺的部位通常为
A. 肩胛角线第6~7肋间 B. 肩胛角线第7~9肋间 C. 锁骨中线第6~7肋间
D. 锁骨中线第7~9肋间 E. 腋前线第6~7肋间 ()
66. 下列疾病引起出血,哪种不属于上消化道出血:

- A. 食管裂孔疝 B. 胃溃疡 C. 胰腺癌
D. 十二指肠球部溃疡 E. 出血性盲肠炎 ()
67. 正常人胸部叩诊不出现的叩诊音是
A. 清音 B. 浊音 C. 实音
D. 鼓音 E. 过清音 ()
68. 代谢性碳中毒治疗时输注等渗盐水是因为
A. 恢复细胞外液量
B. 等渗盐水中 Na^+ 较血清 Na^+ 低
C. 增加尿中 NaHCO_3 的排出
D. 等渗盐水含 Cl^- 较血清 Cl^- 含量高,纠正低氯碱中毒
E. 补充水分 ()
69. 现代休克概念是指
A. 对血压急骤下降引起的反应 B. 对有效循环血容量锐减的反应
C. 大失血造成的周围血管收缩反应 D. 创伤致神经系统剧烈反应
E. 血液透析 ()
70. 血压下降是
A. 诊断休克的惟一依据 B. 休克最常见的临床表现
C. 估计休克程度的主要指标 D. 反映组织细胞缺氧的重要指示
E. 以上都是 ()
71. 破伤风是一种
A. 毒血症 B. 菌血症 C. 败血症
D. 脓血症 E. 脓毒败血症 ()
72. 胃肠道手术后感染的常见致病菌是
A. 大肠杆菌 B. 绿脓杆菌 C. 变形杆菌
D. 肠杆菌 E. 拟杆菌 ()
73. 无尿期后如出现多尿期,24 小时尿量增加至
A. 200 mL 以上 B. 240 mL 以上 C. 300 mL 以上
D. 350 mL 以上 E. 400 mL 以上 ()
74. 一般头、面、颈部拆线的时间是
A. 4~5 日 B. 6~7 日 C. 8~10 日
D. 11~13 日 E. 14~16 日 ()
75. 最常见的输血并发症是
A. 非溶血性发热反应 B. 变态反应和过敏反应 C. 溶血反应
D. 细菌污染反应 E. 酸碱平衡失调 ()
76. 延迟性溶血反应发生在输血后
A. 1~6 日 B. 7~14 日 C. 15~23 日
D. 24~30 日 E. 31~60 日 ()
77. 诊断少尿 24 小时总尿量应少于

- A. 150ml B. 200ml C. 250ml
D. 350ml E. 400ml ()
78. 肠内营养适应症包括
A. 食管癌晚期 B. 骨癌晚期 C. 肝硬化
D. 低位肠痿 E. 肝癌晚期 ()
79. 创伤后最常见的并发症是
A. 化脓性感染 B. 休克 C. 体温增高
D. 应激性溃疡 E. 多系统功能衰竭 ()
80. 关于肿瘤下列哪项叙述不正确
A. 良性肿瘤多为外生性或膨胀生长
B. I 级分化细胞恶性程度低
C. 皮肤或粘膜的乳头状瘤是癌前期病变
D. 原位癌转变为浸润性癌约需 10~15 年
E. II 期肿瘤应行原发灶和转移灶的切除或放疗, 全身化疗。 ()
81. 在 TNM 分期中, 原位癌应标记为
A. N₀ B. N₁ C. M₀ D. M₁ E. Tis ()
82. 痈常发生在身体的
A. 颈项部 B. 胸部 C. 腰部 D. 会阴部 E. 下肢 ()
83. 关于急性肾功能衰竭, 下列哪项是错误的
A. 肾衰是临床各科常遇到的疾病
B. 肾后性肾衰又称功能性肾衰, 只要警惕是能防止的
C. 肾前性肾衰若及时解除梗阻预后良好
D. 判断急性肾衰最简易的方法是测定尿量、尿比重与血尿素氮
E. 急性肾衰的死亡率很高, 但诊疗及时是能挽救的 ()
84. 要素饮食可能产生的代谢方面的合并症是
A. 高钠、高氯 B. 氮质血症 C. 凝血酶原过低
D. 高渗性非酮性昏迷 E. 以上都是 ()

得分	评卷人

二、B 型题: 85~108 小题。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项目, 每小题只能从中选择一个最符合题目要求的, 每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 角膜 B. 巩膜 C. 结膜
D. 晶状体 E. 玻璃体
85. 能调节进入眼内光线量的结构是 ()
86. 无色透明有弹性、不含神经血管的结构是 ()
- A. 甲状腺上动脉 B. 甲状腺下动脉 C. 脾动脉
D. 中结肠动脉 E. 睾丸动脉
87. 由颈外动脉发出的是 ()

88. 由腹主动脉发出的是 ()
 A. 中央旁小叶 B. 扣带回 C. 齿状回 D. 海马 E. 钩
89. 中央前,后回上端延伸至大脑半球内侧面的一部分是 ()
90. 围绕胼胝体的是 ()
 A. 神经调节 B. 体液调节 C. 自身调节
 D. 负反馈 E. 前馈
91. 胰岛细胞分泌胰岛素,促进细胞对葡萄糖的摄取和利用,属于 ()
92. 使内环境理化性质保持相对恒定的调节,属于 ()
 A. α 波 B. β 波 C. θ 波 D. δ 波 E. α 波阻滞
93. 成人在清醒,安静并闭眼时出现 ()
94. 在幼儿时期,脑电波的主要节律是 ()
 A. 糖皮质激素分泌过多 B. 幼年时甲状腺功能不足
 C. 食物中缺碘 D. 食物中缺蛋白质
 E. 幼年时生长素分泌不足
95. 呆小症的病因是由于 ()
96. 地方性甲状腺肿的病因是由于 ()
 A. 腹壁明显紧张,有压痛,反跳痛 B. 腹部柔韧有抵抗力
 C. 前腹壁水平明显低下,肋弓和耻骨联合显露 D. 腹部静脉迂曲变粗,显而易见
 E. 左腰部皮肤呈蓝色
97. 急性腹膜炎会出现上述哪项体征 ()
98. 肝硬化会出现上述哪项体征 ()
 A. 疖 B. 痈 C. 丹毒
 D. 急性蜂窝织炎 E. 脓肿
99. 皮肤及其网状淋巴管急性炎症
100. 多个相邻的毛囊及其所属皮脂腺或汗腺的急性化脓性感染 ()
 A. 递增型 B. 递减型 C. 递增—递减型
 D. 连续型 E. 一贯型
101. 二尖瓣狭窄时,心尖部舒张期隆隆样杂音 ()
102. 主动脉瓣关闭不全时,主动脉瓣区的舒张期杂音 ()
 A. 0.01s B. 0.11s C. 0.12s
 D. 0.11~0.17s E. 0.12~0.20s
103. 正常 P 波时限小于 ()
104. P—R 间期正常值为 ()
 A. 原发性感染 B. 继发性感染 C. 非特异性感染
 D. 二重感染 E. 特异性感染
105. 具有炎症共同特征称 ()
106. 一种致病菌只引起一种炎症疾病称 ()
 A. 输尿管结石 B. 盆腔肿瘤 C. 外伤性脾破裂

D. 前列腺增生 E. 氨基糖苷类抗生素

107. 可引起肾前性肾功能衰竭 ()

108. 可引起肾性肾功能衰竭 ()

得分	评卷人

三、X 型题:109~120 小题,在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中至少有一项是符合题目要求的,多选或少选均不得分。

109. 开口于中鼻道的鼻旁窦是

- A. 蝶窦 B. 额窦 C. 筛窦前、中群
D. 筛窦后群 E. 上颌窦 ()

110. 右心房的入口有

- A. 肺静脉口 B. 上腔静脉口 C. 下腔静脉口
D. 冠状窦口 E. 房室口 ()

111. 含有副交感神经纤维的脑神经有

- A. 动眼神经 B. 舌咽神经 C. 舌下神经
D. 迷走神经 E. 面神经 ()

112. 下列可引起组织水肿的因素有

- A. 毛细血管血压升高 B. 血浆胶体渗透压降低 C. 毛细血管通透性增大
D. 血浆晶体渗透压降低 E. 淋巴液回流受阻 ()

113. 气体通过呼吸膜扩散速率取决于

- A. 该气体分压差高低 B. 该气体溶解度大小 C. 该气体相对分子质量大小
D. 呼吸膜厚度大小 E. 气体扩散距离远近 ()

114. 交感神经节包括

- A. 睫状神经节 B. 肠系膜上节 C. 腹腔神经节
D. 肠系膜下节 E. 器官旁节 ()

115. 晕厥的原因有

- A. 颈动脉窦高敏 B. 肥厚性梗阻性心肌病 C. 心尖肥厚性心肌病
D. 单纯心肌收缩力增强 E. 预激伴快速房颤 ()

116. 下列关于吸气性呼吸困难特点的叙述正确的是

- A. 吸气显著困难 B. 呼气费力 C. 可出现三凹征
D. 可伴有干咳及哮鸣音 E. 呼气时间延长 ()

117. 大量腹水的体征包括

- A. 蛙腹 B. 液波震颤 C. 脐疝
D. 振水音 E. 全腹叩鼓音 ()

118. 急性心肌梗死的心电图诊断包括

- A. “缺血性”改变,出现 S—T 水平型下移及 T 波倒置
B. “缺血性”改变,出现对称性 T 波倒置
C. “损伤性”改变,S—T 弓背型明显抬高与 T 波形成单向曲线

D. “坏死性”改变,出现异常 Q 波或 QS 波

E. QRS 波群振幅增高 ()

119. 手术后 2~3 日早期下床活动的好处有

A. 减少肺部并发症 B. 改善全身血液循环 C. 有利肠道及膀胱功能早日恢复

D. 减少切口感染 E. 减少因下肢静脉淤血而发生血栓 ()

120. 呼吸心跳停止后发生的酸碱失衡是

A. 代谢性碱中毒 B. 呼吸性酸中毒 C. 呼吸性碱中毒

D. 代谢性酸中毒 E. 以上都对 ()

医学综合模拟试卷(五)

题 号	一	二	三	总分	统分人签字
分 数					

得分	评卷人

一、A 型题：1～84 小题，在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 下列属于肩胛骨上的结构是

- A. 三角肌粗隆 B. 喙突 C. 冠突
D. 齿突 E. 茎突 ()

2. 属于椎体间的连结结构是

- A. 棘上韧带 B. 后纵韧带 C. 黄韧带
D. 棘间韧带 E. 项韧带 ()

3. 最强大的脊柱伸肌是

- A. 背阔肌 B. 斜方肌 C. 竖脊肌
D. 腰大肌 E. 腰方肌 ()

4. 关于胃的叙述，正确的是

- A. 胃充盈时，胃大弯向右下方移动
B. 胃底是指贲门切迹平面以上胃的部分
C. 幽门部的右侧部分称幽门窦
D. 胃肌和胃粘膜在幽门形成环行皱襞称幽门瓣
E. 幽门管通常居胃的最底部 ()

5. 开口于上鼻道的是

- A. 上颌窦 B. 下颌窦 C. 额窦
D. 筛窦的前、中群 E. 筛窦的后群 ()

6. 成人肾门平对

- A. 第 11 胸椎 B. 第 12 胸椎 C. 第 1 腰椎
D. 第 2 腰椎 E. 第 3 腰椎 ()

7. 男性的生殖腺是

- A. 睾丸 B. 前列腺 C. 尿道球腺
D. 精囊腺 E. 附睾 ()

8. 对子宫韧带作用的描述，错误的是

- A. 子宫阔韧带限制子宫向两侧移位 B. 子宫圆韧带防止子宫下垂
C. 骶子宫韧带维持子宫前屈 D. 子宫主韧带防止子宫下垂

- E. 子宫圆韧带维持子宫的前倾 ()
9. 心肌正常收缩的起搏点是
- A. 窦房结 B. 房室结 C. 房室束
D. 房室交点 E. 颈动脉窦 ()
10. 胆囊动脉发自
- A. 肝总动脉 B. 肝固有动脉 C. 肝左动脉
D. 肝右动脉 E. 以上都不是 ()
11. 有关淋巴结的描述,错误的是
- A. 是淋巴器官的组成部分 B. 常位于身体较隐蔽安全处
C. 输出淋巴管与其凸侧相连 D. 输出淋巴管数目少于输入淋巴管
E. 淋巴结常聚集成群 ()
12. 下肢的浅静脉有
- A. 胫前静脉 B. 胫后静脉 C. 贵要静脉
D. 大隐静脉 E. 腘静脉 ()
13. 眼视近物时
- A. 晶状体凸度变大,瞳孔缩小 B. 晶状体凸度变大,瞳孔扩大
C. 晶状体凸度变小,瞳孔缩小 D. 晶状体凸度变小,瞳孔扩大
E. 晶状体凸度变小,瞳孔大小无变化 ()
14. 能震动内耳外淋巴的是
- A. 砧骨 B. 蹬骨 C. 锤骨
D. 腭帆张肌 E. 蹬骨肌 ()
15. 不属于臂丛的神经是
- A. 膈神经 B. 肌皮神经 C. 桡神经
D. 腋神经 E. 尺神经 ()
16. 胸长神经支配
- A. 背阔肌 B. 大圆肌 C. 前锯肌
D. 肩胛下肌 E. 菱形肌 ()
17. 最大的副交感神经是
- A. 动眼神经 B. 面神经 C. 三叉神经
D. 舌咽神经 E. 迷走神经 ()
18. 面神经的作用包括
- A. 支配咀嚼肌运动 B. 支配舌肌运动 C. 支配面肌运动
D. 支配喉肌运动 E. 控制腮腺的分泌 ()
19. 关于脊髓的描述,何者错误
- A. 脊髓具有传导兴奋的功能,是低级反射中枢
B. 脊髓后索的纤维束传导同侧的深部感觉冲动
C. 侧索中仅包括感觉纤维束
D. 成人脊髓平对第 10~12 胸椎

- E. 椎管内的马尾围绕终丝 ()
20. 肺下界的体表投影在锁骨中线相交于
A. 第 5 肋 B. 第 6 肋 C. 第 7 肋
D. 第 8 肋 E. 第 9 肋 ()
21. 小脑
A. 位于颅中窝 B. 上面与大脑枕叶直接相贴
C. 小脑扁桃体位于小脑半球的后方 D. 绒球属新小脑
E. 借上脚与中脑联系 ()
22. 细胞生活的内环境是指下列哪项而言
A. 体液 B. 细胞内液 C. 细胞外液
D. 组织液 E. 血液 ()
23. 对静息电位的叙述,错误的是
A. 由 K^+ 外流导致,相当于 K^+ 的平衡电位
B. 膜内电位较膜外为负
C. 其数值相对稳定不变
D. 各种细胞的静息电位是相等的
E. 细胞处于极化状态 ()
24. 神经细胞动作电位上升支的形成是由于
A. Ca^{2+} 内流 B. Na^+ 和 Ca^{2+} 内流 C. Cl^- 内流
D. K^+ 外流 E. Na^+ 内流 ()
25. 全血的比重主要决定于
A. 血浆蛋白含量 B. 渗透压的高低 C. 红细胞数量
D. 白细胞数量 E. $NaCl$ 的浓度 ()
26. 通常所说的血型是指
A. 红细胞膜上的受体类型 B. 红细胞膜上抗原的类型
C. 红细胞膜上凝集素的类型 D. 血浆中凝集原的类型
E. 血浆中抗体的类型 ()
27. 心动周期是指
A. 心脏机械活动周期 B. 心脏生物电活动周期 C. 心音活动周期
D. 心率变化周期 E. 室内压变化周期 ()
28. 关于静脉血压的叙述,哪一项是错误的
A. 站立时颅内静脉窦的压力低于大气压
B. 正常成人在立正状态下,足背静脉压和主动脉平均压几乎相等
C. 深吸气时中心静脉压升高
D. 中心静脉压的高低与心脏的射血能力有关
E. 足背静脉压在行走时比立正时低 ()
29. 维持胸膜腔内负压的必要条件是
A. 肺内压高于大气压 B. 肺内压高于胸膜腔内压

- C. 胸膜腔密闭
E. 气道跨壁压等于大气压 ()

30. 二氧化碳分压由高到低的顺序是
A. 静脉血、肺泡、组织细胞
B. 静脉血、组织细胞、肺泡
C. 肺泡、组织细胞、静脉血
D. 组织细胞、肺泡、静脉血
E. 组织细胞、静脉血、肺泡 ()

31. 消化和吸收的主要部位是
A. 口腔
B. 胃
C. 小肠
D. 回肠
E. 结肠 ()

32. 胃液中内因子的作用为
A. 激活胃蛋白酶原
B. 参与胃黏膜屏障作用
C. 促进维生素 B_{12} 的吸收
D. 促进胃泌素的释放
E. 抑制胃蛋白酶的激活 ()

33. 支配汗腺的交感神经末梢释放的递质是
A. 肾上腺素
B. 去甲肾上腺素
C. 乙酰胆碱
D. 5-羟色胺
E. 多巴胺 ()

34. 大失血时,引起少尿的主要原因是
A. 血浆胶体渗透压升高
B. 肾小球血浆流量明显下降
C. 滤过膜面积减少
D. 肾小球血浆流量明显上升
E. 滤过膜通透性下降 ()

35. 醛固酮主要由下列哪一部位释放
A. 肾上腺髓质
B. 肾上腺皮质球状带
C. 肾上腺皮质束状带
D. 肾上腺皮质网状带
E. 肾皮质 ()

36. 视觉器官的感觉器是
A. 视神经
B. 感光细胞
C. 角膜
D. 晶状体
E. 玻璃体 ()

37. 声波感受器是
A. 球囊囊斑毛细胞
B. 椭圆囊囊斑毛细胞
C. 半规管壶腹嵴毛细胞
D. 耳蜗基底膜毛细胞
E. 耳石 ()

38. 产生突触前抑制是由于突触前膜
A. 产生超极
B. 递质耗竭
C. 释放抑制性递质
D. 兴奋性递质释放减少
E. 兴奋性降低 ()

39. 正常人在安静、清醒、闭目时,出现的脑电波形是
A. α 波
B. β 波
C. θ 波
D. δ 波
E. γ 波 ()

40. 神经兴奋时,首先产生动作电位的部位是
A. 胞体
B. 树突
C. 轴突
D. 树突始段
E. 轴突始段 ()

41. 刺激胰岛素分泌最主要的因素是

- A. 胃泌素释放 B. 迷走神经兴奋 C. 血糖浓度升高
D. 血氨基酸浓度升高 E. 胰高血糖素释放 ()
42. 下列哪种激素是由神经垂体分泌的
A. 促黑激素 B. 催乳素 C. 生长素
D. 抗利尿激素 E. 黄体生成素 ()
43. 现病史应包括下列哪些内容
A. 起病时间、起病情况和可能的诱因
B. 主要症状的描述
C. 病情的发生、发展过程
D. 起病后诊疗过程以及与本次疾病有关的病史
E. 以上均应包括在内 ()
44. 高热期与无热期各持续若干天,这种发热属于下列哪种热型
A. 周期热 B. 波状热 C. 间歇热
D. 不整热 E. 回归热 ()
45. 疼痛部位开始于中上腹或脐周,以后转移至右下腹,这种腹痛常见于下列哪种疼痛
A. 小肠疾病 B. 肠穿孔 C. 肾结石
D. 急性阑尾炎 E. 肠虫症 ()
46. 肾源性水肿的特点为
A. 低蛋白血症 B. 颈静脉怒张
C. 首先出现于身体下垂部位 D. 先消瘦,后水肿
E. 肝大 ()
47. 贫血伴轻度黄疸,应考虑
A. 再生障碍性贫血 B. 脾功能亢进 C. 急性白血病
D. 溶血性贫血 E. 巨幼红细胞性贫血 ()
48. 胃泌素瘤引起的腹泻属于
A. 吸收不良性腹泻 B. 动力性腹泻 C. 渗出性腹泻
D. 渗透性腹泻 E. 分泌性腹泻 ()
49. 少尿的标准是
A. 24 小时尿量少于 600ml B. 24 小时尿量少于 500ml
C. 24 小时尿量少于 400ml D. 24 小时尿量少于 300ml
E. 24 小时尿量少于 200ml ()
50. 呼吸困难依据病因可分为下列几种,但除外
A. 肺源性呼吸困难 B. 心源性呼吸困难 C. 中毒性呼吸困难
D. 血源性呼吸困难 E. 吸气性呼吸困难 ()
51. 18 岁男性,多次于站立中出现晕厥,常规心电图、起声心电图未发现异常,其晕厥原因最可能是
A. 神经介导性晕厥 B. 心源性晕厥 C. 血管迷走性晕厥
D. 精神性 E. 肺梗死 ()
52. 骨骼肌对哪项损伤性刺激最敏感

- A. 刺伤 B. 切割 C. 烧灼 D. 挤压 E. 缺血 ()
53. 颜面潮红,呼吸急促,烦躁不安,痛苦呻吟为
A. 病危面容 B. 慢性面容 C. 急性面容
D. 甲亢面容 E. 二尖瓣面容 ()
54. 体位对疾病的诊断意义哪项正确
A. 仰卧位见于胸膜炎 B. 腹卧位见于急腹症
C. 端坐位见于心肺功能不全 D. 变换体位见于神经官能症
E. 以上均不对 ()
55. 干性啰音不包括
A. 鼾音 B. 哮鸣音 C. 哨笛音
D. 支气管语音 E. 飞箭音和丝丝音 ()
56. 应用口测法测体温,下列正确的是
A. 正常值为 $36.5\sim 37.2^{\circ}\text{C}$
B. 将消毒过的体温计置入舌下,紧闭口唇,不用口腔呼吸
C. 放置口腔内的时间为 10min
D. 正常人 24h 内体温波动在 1°C 以上
E. 测量方法方便、发热患者均可使用 ()
57. 判断营养状态最简便而迅速的方法是观看
A. 皮肤弹性 B. 毛发疏密程度 C. 皮下脂肪充实程度
D. 肌肉发育情况 E. 指甲光泽 ()
58. 震颤麻痹患者往往采用
A. 慌张步态 B. 蹒跚步态 C. 醉酒步态
D. 跨阈步态 E. 共济失调步态 ()
59. 甲状腺肿大时与颈前其他肿块的鉴别,下列哪项最重要
A. 甲状腺位于甲状软骨下方 B. 甲状腺表面光滑
C. 甲状腺可随吞咽动作上下移动 D. 甲状腺可呈弥漫性,对称性肿大
E. 甲状腺肿大的程度多在胸锁乳突肌以内 ()
60. 不引起 S-T 段上抬的疾病是
A. 急性心肌梗塞 B. 变异性心绞痛 C. 室壁瘤
D. 风湿热 E. 充血性心肌病 ()
61. 血红蛋白及红细胞绝对值增高最常见于
A. 尿崩症 B. 异常血红蛋白病 C. 慢性肾上腺功能减退
D. 真性红细胞增多症 E. 糖尿病酮症酸中毒 ()
62. 稀糊状便常见于
A. 细菌性痢疾 B. 阿米巴痢疾 C. 急性肠炎
D. 消化不良 E. 结肠癌 ()
63. 下列哪一项不是右房肥大的心电图改变
A. P 波高而尖 B. P 幅度 $\geq 0.25\text{mV}$

- C. 因右房除极时间延长, P 宽度 $\geq 0.12s$ D. P 波改变在 II、III、DVF 导联最显著
E. P—R 不因右房肥大而延长 ()
64. 胸腔穿刺应避免在第几肋间以下穿刺
A. 第 5 肋间 B. 第 6 肋间 C. 第 7 肋间
D. 第 8 肋间 E. 第 9 肋间 ()
65. 第一心音不增强的是
A. 二尖瓣狭窄 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 期前收缩的第一心音
D. 心房心室同时收缩 E. 心动过速 ()
66. 下述哪项不是浅反射
A. 角膜反射 B. 痛温觉 C. 腹壁反射
D. 提睾反射 E. 咽反射 ()
67. 当同时存在水、电解质和酸碱平衡失衡时, 首先应
A. 调节 Na^+ 不足 B. 调节 Cl^- 不足 C. 调节 K^+ 不足
D. 调节酸碱失衡 E. 调节容量不足 ()
68. 休克时最主要的治疗是
A. 抗感染 B. 补足血容量 C. 去甲肾上腺素的应用
D. 纠正酸毒 E. 消除休克毒素 ()
69. 破伤风病人, 气管切开的指征主要是
A. 呼吸中枢麻痹 B. 肺部感染
C. 抽搐频繁, 而又不易用药控制 D. 吞咽困难, 防止食物误吸
E. 腹直肌强直, 呼吸受限 ()
70. 手术后肺不张的防治, 哪项是错误的
A. 术前锻炼深呼吸 B. 急性上呼吸道感染病人应首先控制感染
C. 防止手术后呕吐物吸入 D. 及时用镇咳药
E. 手术后避免限制呼吸 ()
71. 关于输血的适应证, 下列哪项是错误的
A. 大出血 B. 贫血或低蛋白血症 C. 消瘦
D. 严重感染 E. 凝血异常 ()
72. 无并发症的胃大部切除术后, 病人的体重比术前减轻
A. 2kg B. 3kg C. 4kg D. 5kg E. 5kg 以上 ()
73. 男, 40 岁, 双下肢(包括双臀、双大腿、双小腿、双足)烧伤, 其烧伤面积占体表总面积的
A. 45% B. 46% C. 48% D. 50% E. 51% ()
74. 皮肤基底细胞癌的特点是
A. 来源于皮肤或附件基底细胞 B. 呈浸润性生长
C. 破溃者呈鼠咬状溃疡边缘 D. 好发于头面部
E. 以上都是 ()
75. 胃癌手术时发现卵巢上有癌结节, 这是由于
A. 血行转移 B. 淋巴转移 C. 直接转移

- D. 种植性转移 E. 医源性种植 ()
76. 口对口人工呼吸时, O_2 的分压可达到
A. 40mmHg B. 50mmHg C. 60mmHg D. 80mmHg E. 70mmHg ()
77. 胸外心脏按压部位是
A. 心前区 B. 胸骨中、下 1/3 交界处 C. 胸骨中、上 1/3 交界处
D. 胸骨角 E. 胸骨左侧第 4 肋间 ()
78. 急性心肌梗塞病人多长时间内不施行择期手术
A. 2 个月内 B. 3 个月内 C. 4 个月内 D. 5 个月内 E. 6 个月内 ()
79. 创伤感染后内分泌反应哪项是错误的
A. 胰岛素分泌减少 B. 肾上腺素分泌增加 C. 胰高血糖素增加
D. 肾上腺皮质激素分泌减少 E. 抗利尿激素分泌增加 ()
80. 下面的疾病中, 不属于非特异性感染的是
A. 疖 B. 痈 C. 气性坏疽
D. 急性阑尾炎 E. 急性乳腺炎 ()
81. 急性肾功能衰竭病人少尿期或无尿期出现水中毒的主要原因是
A. 体内内生水多 B. 抗利尿激素增加 C. 钠潴留
D. 酸中毒 E. 未严格限制水钠的摄入 ()
82. 35 岁男性车间工人, 不幸右股动脉刺破造成大出血, 压迫止血 2 小时, 查体脉搏 110 次/min, 血压 85/70mmHg。对该病人进一步处理哪项是错误的
A. 继续压迫, 输注血管收缩剂 B. 输血补充血容量
C. 静脉注射多巴胺 D. 静脉滴注碳酸氢钠
E. 争取尽快修补股动脉 ()
83. 休克治疗时应用血管活性药物的目的是
A. 升高血压 B. 提高组织器官的血液灌流
C. 提高心脏前负荷 D. 提高心脏后负荷
E. 增加心肌收缩力 ()
84. 患者男性, 40 岁, 8 小时前因塌方砸伤双下肢, 伤后排尿一次, 红茶色。体检: 神清, 血压 140/90mmHg, 脉搏 62 次/min, 心律不齐, 肢体肌张力低, 对此病人不应选择哪项治疗
A. 输入甘露醇 B. 输入碳酸氢钠 C. 输血
D. 口服离子交换树脂 E. 输入葡萄糖加胰岛素 ()

得分	评卷人

二、B 型题: 85~108 小题。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项, 每小题只能从中选择一个最符合题目要求的, 每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 丧失讲话能力 B. 不理解别人的讲话 C. 不懂文字含义
D. 不能识别物体 E. 不能识别音乐主旋律
85. 优势半球额下回后部损伤 ()
86. 优势半球额上回后部损伤 ()

- A. 颊黏膜 B. 舌下阜 C. 舌下襞 D. 舌根 E. 舌盲孔
87. 舌下腺小管开口于 ()
88. 舌下腺大管开口于 ()
- A. 舌扁桃体 B. 腭扁桃体 C. 咽鼓管扁桃体
D. 咽扁桃体 E. 咽侧索
89. 位于扁桃体窝的是 ()
90. 位于鼻咽顶后壁黏膜下的是 ()
- A. 单纯扩散 B. 载体中介的易化扩散
C. 通道中介的易化扩散 D. 主动转运 E. 胞吐
91. 葡萄糖顺浓度梯度进入一般细胞属于 ()
92. 静息状态下 K^+ 由细胞内向膜外扩散属于 ()
- A. 肾上腺素 B. 去甲肾上腺素 C. 多巴胺
D. γ -氨基丁酸 E. 乙酰胆碱
93. 支配心脏的迷走神经所释放的递质为 ()
94. 支配骨骼肌的躯体运动神经所释放的递质为 ()
- A. 叠连 B. 粘连 C. 聚集 D. 凝集 E. 凝固
95. 血液由溶胶状态变成凝胶状态称为 ()
96. 红细胞互助以凹面相贴称为 ()
- A. $36.3^{\circ}\text{C} \sim 37.2^{\circ}\text{C}$ B. $36.5^{\circ}\text{C} \sim 37.7^{\circ}\text{C}$ C. $37.3^{\circ}\text{C} \sim 38.0^{\circ}\text{C}$
D. $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39.0^{\circ}\text{C}$ E. $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41.0^{\circ}\text{C}$
97. 口测法正常体温 ()
98. 肛测法正常体温 ()
- A. 反复少量咯血伴呛咳 B. 痰中带血伴发热盗汗
C. 脓血痰,量多 D. 咯血,皮肤粘膜出血点
E. 突然大咯血,骤然咯血停止
- 下述病符合上述何种咯血表现
99. 干性支气管扩张症 ()
100. 肺脓肿 ()
- A. 胸骨角 B. 肩胛下角 C. 胸骨上角
D. 背部第 6、7 颈椎 E. 正常肺泡呼吸音部位
101. 临床上用于计算前肋和肋间隙的标志是 ()
102. 异常支气管呼吸音的听诊部位是 ()
- A. $110 \sim 150\text{g/L}$ B. $120 \sim 160\text{g/L}$ C. $130 \sim 170\text{g/L}$
D. $150 \sim 190\text{g/L}$ E. $170 \sim 190\text{g/L}$
103. 成年男性的血红蛋白正常值为 ()
104. 成年女性的血红蛋白正常值为 ()
- A. 8 小时 B. 12 小时 C. 24 小时 D. 1 周 E. 1~2 周
105. 腹内手术者术前多长时间禁食 ()

106. 吸烟患者,较长手术前多长时间应停止吸烟 ()
 A. 发热反应 B. 过敏反应 C. 溶血反应
 D. 细菌污染反应 E. 变态反应
107. 误输血型不相配的血液会发生 ()
108. 输血的早期并发症中最严重的是 ()

得分	评卷人

三、X 型题: 109~120 小题,在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,至少有一项是符合题目要求的,多选或少选均不得分。

109. 属于唾液腺的是 ()
 A. 舌腺 B. 腮腺 C. 甲状腺 D. 舌下腺 E. 颌下腺
110. 房水 ()
 A. 晶状体产生 B. 对角膜晶状体有营养作用
 C. 自眼球前房经瞳孔到达后房入巩膜静脉窦 D. 回流受阻时,可使眼压增高
 E. 为屈光装置之一
111. 哪些功能与边缘系统有关 ()
 A. 嗅觉 B. 内脏运动 C. 情绪反应
 D. 性活动 E. 学习与记忆
112. 关于条件反射的概念下列叙述哪些是正确的 ()
 A. 是后天获得的 B. 是一种高级的神经活动 C. 无固定的反射弧
 D. 可以消退 E. 数量无限
113. 促进胆汁分泌和排放的有 ()
 A. 交感神经兴奋 B. 迷走神经兴奋 C. 胆盐
 D. 胃泌素 E. 促胰液素
114. 使 Na^+ 重吸收增加的因素有 ()
 A. 醛固酮分泌增加 B. 抗利尿激素分泌增加 C. 肾素分泌增加
 D. 血 Na^+ 浓度增高 E. 血 K^+ 浓度增高
115. 下列与遗传有关的疾病是 ()
 A. 血友病 B. 白化病 C. 糖尿病
 D. 家族性结肠息肉 E. 家族性甲状腺功能减退
116. 病理性红细胞减少见于 ()
 A. 各种原因造成的血液稀释
 B. 各种急、慢性失血性疾病
 C. 造血原料(铁、叶酸、维生素 B_{12})缺乏
 D. 红细胞生成减少(如再生障碍性贫血)
 E. 溶血性贫血
117. 正常人腹部触诊可触及到的组织器官有哪些 ()
 A. 腰椎椎体 B. 乙状结肠 C. 脾脏

D. 肝脏

E. 肾脏

()

118. 血沉增快常见于

A. 传染病

B. 急性炎症

C. 血液病

D. 系统性红斑狼疮

E. 心肌梗塞

()

119. 诊断代谢性酸中毒的主要依据为

A. 呼吸深而快

B. $[\text{HCO}_3^-]$ 升高

C. 二氧化碳结合力下降

D. $[H_2CO_3]$ 升高

E. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 降低

()

120. 常用的血液成分制品有

A. 浓缩红细胞

B. 浓缩白蛋白液

C. 血浆

D. 右旋糖酐

E. 羟乙基淀粉

()

医学综合模拟试卷(一)参考答案

一、A 型题

1.A	2.E	3.A	4.E	5.A	6.E	7.C	8.A	9.E	10.B
11.C	12.B	13.B	14.B	15.B	16.E	17.E	18.A	19.B	20.C
21.E	22.C	23.B	24.C	25.B	26.A	27.D	28.B	29.E	30.D
31.C	32.B	33.C	34.D	35.B	36.E	37.D	38.D	39.D	40.C
41.E	42.C	43.E	44.C	45.E	46.E	47.D	48.A	49.D	50.B
51.C	52.A	53.C	54.A	55.E	56.B	57.C	58.B	59.D	60.E
61.C	62.B	63.B	64.D	65.A	66.A	67.A	68.B	69.D	70.C
71.A	72.A	73.A	74.C	75.D	76.C	77.D	78.E	79.B	80.D
81.D	82.B	83.E	84.A						

二、B 型题

85.A	86.B	87.B	88.A	89.C	90.D	91.B	92.C	93.A	94.E
95.C	96.D	97.A	98.D	99.D	100.B	101.D	102.B	103.D	104.B
105.D	106.B	107.D	108.B						

三、X 型题

109.BDE	110.ABCD	111.ABDE	112.ABC	113.ABCE	114.ABC
115.ABC	116.BD	117.BD	118.ABCDE	119.ABCE	120.ABCE

医学综合模拟试卷(二)参考答案

一、A 型题

1.B	2.A	3.A	4.B	5.C	6.C	7.E	8.E	9.E	10.C
11.E	12.D	13.A	14.A	15.E	16.E	17.C	18.A	19.A	20.D
21.E	22.C	23.C	24.C	25.B	26.E	27.D	28.E	29.C	30.B
31.C	32.D	33.C	34.C	35.B	36.E	37.B	38.D	39.D	40.A
41.E	42.C	43.C	44.A	45.A	46.A	47.E	48.C	49.A	50.E
51.E	52.C	53.A	54.D	55.A	56.E	57.E	58.D	59.B	60.A
61.B	62.E	63.D	64.D	65.C	66.B	67.C	68.A	69.C	70.A
71.B	72.C	73.D	74.C	75.D	76.B	77.E	78.D	79.B	80.A
81.E	82.A	83.E	84.A						

二、B 型题

85.A	86.B	87.C	88.D	89.A	90.B	91.E	92.A	93.E	94.B
95.D	96.B	97.C	98.D	99.B	100.E	101.C	102.D	103.A	104.D
105.C	106.E	107.A	108.C						

三、X 型题

109.ABD	110.BCD	111.ABCD	112.BCE	113.ABDE	114.ABCDE
115.ACDE	116.ABCE	117.ABDE	118.ABCDE	119.AC	120.ABCD

医学综合模拟试卷(三)参考答案

一、A 型题

1. C 2. C 3. B 4. A 5. D 6. B 7. C 8. C 9. C 10. A
11. B 12. E 13. B 14. B 15. B 16. E 17. D 18. D 19. D 20. A
21. E 22. B 23. B 24. D 25. A 26. D 27. B 28. A 29. B 30. D
31. C 32. C 33. E 34. D 35. A 36. B 37. C 38. C 39. B 40. A
41. E 42. C 43. A 44. B 45. C 46. E 47. D 48. A 49. E 50. D
51. D 52. C 53. A 54. D 55. C 56. E 57. C 58. B 59. C 60. C
61. C 62. B 63. D 64. C 65. E 66. D 67. C 68. E 69. E 70. C
71. C 72. E 73. A 74. D 75. A 76. B 77. C 78. A 79. E 80. B
81. E 82. D 83. D 84. E

二、B 型题

85. A 86. C 87. B 88. E 89. A 90. C 91. A 92. D 93. B 94. A
95. A 96. C 97. C 98. E 99. B 100. D 101. A 102. C 103. B 104. E
105. A 106. C 107. A 108. E

三、X 型题

109. CDE 110. ACD 111. ACE 112. AC 113. ABC
114. ABCE 115. BCDE 116. ABCDE 117. BCDE 118. ABCDE
119. BDE 120. ABCD

医学综合模拟试卷(四)参考答案

一、A 型题

1. E 2. A 3. A 4. C 5. D 6. E 7. E 8. B 9. C 10. C
11. E 12. C 13. B 14. B 15. B 16. D 17. D 18. E 19. E 20. C
21. D 22. A 23. C 24. C 25. D 26. B 27. E 28. D 29. E 30. D
31. C 32. C 33. C 34. D 35. A 36. C 37. E 38. B 39. D 40. B
41. D 42. C 43. E 44. A 45. C 46. C 47. B 48. A 49. E 50. A
51. D 52. B 53. C 54. B 55. A 56. C 57. A 58. E 59. A 60. C
61. D 62. A 63. D 64. E 65. B 66. E 67. E 68. D 69. B 70. B
71. A 72. E 73. E 74. A 75. A 76. B 77. E 78. D 79. A 80. D
81. E 82. A 83. A 84. E

二、B 型题

85. B 86. D 87. A 88. E 89. A 90. B 91. B 92. D 93. A 94. C
95. E 96. C 97. A 98. D 99. C 100. B 101. A 102. B 103. B 104. E
105. C 106. E 107. C 108. E

三、X 型题

109. BCE 110. BCD 111. ABDE 112. ABCE 113. ABCDE
114. BCD 115. ABE 116. ACD 117. ABC 118. ABCDE
119. ABCE 120. BD

医学综合模拟试卷(五)参考答案

一、A 型题

1. B 2. B 3. C 4. B 5. E 6. C 7. A 8. B 9. A 10. D
11. C 12. D 13. A 14. B 15. A 16. C 17. E 18. C 19. C 20. B
21. E 22. A 23. D 24. E 25. C 26. B 27. A 28. C 29. C 30. E
31. C 32. A 33. C 34. B 35. B 36. A 37. D 38. D 39. A 40. E
41. C 42. D 43. E 44. A 45. D 46. A 47. D 48. E 49. C 50. E
51. C 52. E 53. C 54. C 55. D 56. B 57. A 58. A 59. C 60. E
61. D 62. C 63. C 64. E 65. B 66. B 67. E 68. B 69. C 70. D
71. C 72. E 73. B 74. E 75. D 76. D 77. B 78. E 79. D 80. C
81. E 82. A 83. B 84. C

二、B 型题

85. A 86. B 87. C 88. B 89. B 90. D 91. B 92. C 93. E 94. E
95. E 96. A 97. A 98. B 99. E 100. C 101. A 102. E 103. B 104. A
105. B 106. E 107. C 108. C

三、X 型题

109. BDE 110. BDE 111. ABCDE 112. ABCDE 113. BCDE
114. ACE 115. ABCDE 116. BCDE 117. ABDE 118. ABCDE
119. ACE 120. ABC