
成考《专升本-医学综合》模拟试题（3）

1、骨是一种器官，它的构造包括()

A 骨髓、骨密质、骨膜及血管淋巴管和神经 B 骨质、骨膜、骨髓及血管淋巴管和神经

C 骨质、红骨髓、骨膜及血管淋巴管和神经 D 骨松质、骨密质、骨膜及血管淋巴管和神经

E 红骨髓、黄骨髓、骨质及血管淋巴管和神经

2、肋()

A 由肋骨和肋软骨组成 B 分为真肋和浮肋 C 第8~12对肋形成肋弓

D 第2对肋骨与胸骨角侧面的肋切迹形成关节 E 无上述情况

3、下列哪个结构在体表摸不到()

A 骶岬 B 骶角 C 耻骨结节 D 髂前上棘 E 髂结节

4、不属于咀嚼肌的是()

A 咬肌 B 翼内肌 C 翼外肌 D 颞肌 E 颊肌

5、股四头肌麻痹时，其主要运动障碍是不能()

A 内收大腿 B 伸大腿 C 伸小腿 D 屈小腿 E 外展大腿

6、小肠的描述，错误的是()

A 是消化管最长的一段 B 成人全长约5~7 m C 是消化吸收最旺盛的部位

D 全部被肠系膜固定于腹后壁，活动性较大 E 分十二指肠、空肠和回肠

7、胰的描述，不正确的是()

A 分头、体、尾三部 B 在第1、2腰椎水平横卧于腹后 C 胰头被十二指肠环抱

D 胰尾抵达左肾门 E 胰既是消化腺也含内分泌细胞

8、肾的构造()

A 肾髓质由肾锥体和肾柱构成 B 肾乳头开口于肾盂 C 相邻的几个肾小盏汇成一个肾大盏

D 肾柱是肾髓质伸入肾皮质内的部分 E 肾大盏出肾门汇合成输尿管

9、射精管开口于尿道的()

A 前列腺部 B 膜部 C 尿道球部 D 海绵体部 E 舟状窝部

10、体循环终止于()

A 全身各毛细血管 B 左心房 C 右心房 D 右心室 E 肺泡周围的毛细血管网

11、胸导管()

A 起始部位位于腹主动脉前方和膈脚之间 B 由左、右腰干和左、右肠干汇合而成
C 收纳下半身及左侧上半身的淋巴 D 经主动脉裂孔入胸腔,沿脊柱左前方上行 E 行于胸主动脉后

12、不属于肠系膜上动脉的分支是()

A 空、回肠动脉 B 回结肠动脉 C 左结肠动脉 D 中结肠动脉 E 右结肠动脉

13、头臂静脉由以下哪两种静脉汇合而成?()

A 颈外静脉与锁骨下静脉 B 颈外静脉与颈内静脉 C 锁骨下静脉与颈内静脉
D 左、右头臂静脉 E 锁骨下静脉与头静脉

14、虹膜()

A 位于眼球血管膜的中部 B 可以调节晶状体的曲度 C 从房水中获得营养
D 分隔眼前房和眼后房 E 后方紧连脉络膜

15、头部旋转运动的感受器位于()

A 前庭膜 B 基底膜 C 壶腹嵴 D 椭圆囊斑 E 球囊斑

16、成人脊髓圆锥下端平齐()

A 第1腰椎下缘 B 第2腰椎下缘 C 第3腰椎下缘 D 第12胸椎下缘 E 第1骶椎下缘

17、行程中绕肱骨外科颈的神经是()

A 腋神经 B 肩胛下神经 C 肌皮神经 D 桡神经 E 尺神经

18、大脑皮质的中央前回()

A 位于中央前沟前方的脑回 B 位于顶叶 C 中部与上肢运动有关
D 全部由大脑中动脉的皮质支营养 E 一侧损伤时,出现对侧三偏征

19、手的鱼际肌萎缩是由于损伤了()

A 肌皮神经 B 桡神经 C 腋神经 D 正中神经 E 尺神经

20、支配腓骨长肌和腓骨短肌的神经是()

A 腓总神经 B 腓深神经 C 腓浅神经 D 胫神经 E 坐骨神经

21、对视觉传导路的描述，正确的是()

A 第 1 级神经元是位于视网膜内的视细胞 B 第 2 级神经元为节细胞，其轴突组成视神经

C 视交叉为完全性的交叉 D 第 3 级神经元的胞体位于内侧膝状体内

E 一侧视束损伤，双眼同侧偏盲

22、物质在膜蛋白质帮助下，顺浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的过程是属于()

A 单纯扩散 B 易化扩散 C 主动转运 D 入胞 E 出胞

23、组织兴奋性降低，组织的()

A 静息电位值减小 B 动作电位减小 C 刺激阈减小 D 阈值增加 E 反应性增加

24、神经细胞动作电位的幅度接近于()

A 钾平衡电位 B 钠平衡电位 C 静息电位绝对数值与钠平衡电位之和

D 静息电位绝对数值与钠平衡电位之差 E 超射值

25、当血小板数目低于下列哪一数值时，就会出现出血倾向?()

A $50 \times 10^9/L$ B $100 \times 10^9/L$ C $150 \times 10^9/L$ D $200 \times 10^9/L$ E $250 \times 10^9/L$

26、心动周期中，在下列哪个时期主动脉压最低?()

A 等容收缩期末 B 等容舒张期末 C 减慢射血期末 D 快速充盈期末 E 减慢充盈期末

27、衡量心肌自律性高低的主要指标是()

A 动作电位的幅值 B 最大复极电位水平 C 4 期膜电位自动去极化速度 D 阈电位水平

E 0 期去极化速度

28、影响外周阻力的主要因素是()

A 血液黏滞性 B 红细胞数 C 血管长度 D 小动脉和微动脉口径 E 大动脉弹性

29、下列情况下，能使组织液生成减少的是()

A 大量血浆蛋白丢失 B 毛细血管前阻力减小 C 淋巴回流受阻 D 右心衰竭，静脉回流受阻

E 血浆胶体渗透压升高

30、 CO_2 通过呼吸膜扩散的速度比 O_2 快 20 倍，主要原因是 CO_2 ()

A 为主动转运 B 易通过呼吸膜 C 压力梯度比较大 D 相对分子质量比 O_2 大

E 在血中溶解度较大

31、切断家兔颈部双侧迷走神经后使呼吸()

A 变深变快 B 变浅变快 C 变深变慢 D 变浅变慢 E 无变化

32、下列关于表面活性物质的叙述,哪项是错误的?()

A 主要成分是二棕榈酰卵磷脂 B 由肺泡 II 型细胞合成

C 有降低肺泡表面张力的作用 D 具有维持肺泡适当扩张状态的作用

E 降低肺的顺应性

33、糖吸收的分子形式是()

A 淀粉 B 多糖 C 寡糖 D 麦芽糖 E 单糖

34、体温调节的基本中枢位于()

A 下丘脑 B 中脑 C 脑桥 D 延髓 E 脊髓

35、损毁视上核,尿量和尿浓缩将出现哪种变化?()

A 尿量增多,尿高度稀释 B 尿量增多,尿浓缩

C 尿量减少,尿高度稀释 D 尿量增多,尿渗透压正常

E 以上都不是

36、使血管紧张素原转变为血管紧张素 I 的是()

A 血管紧张素转换酶 B 氨基肽酶 C 羧基肽酶 D 肾素 E 肾上腺素

37、声波传入内耳主要途径是()

A 外耳→鼓膜→听骨链→卵圆窗→内耳 B 外耳→鼓膜→鼓室空气→圆窗→内耳

C 外耳→鼓膜→听骨链→圆窗→内耳 D 咽鼓管→鼓室空气→卵圆窗→内耳

E 颅骨→颞骨骨质→耳蜗内淋巴

38、下列哪一项是内脏痛的特点?()

A 刺痛 B 定位不精确 C 必有牵涉痛 D 牵涉痛的部位是内脏在体表的投影部位 E 对电刺激敏感

39、下列关于肌紧张的叙述,错误的是()

A 它是缓慢持久牵拉肌腱时发生的牵张反射 B 是维持躯体姿势的最基本反射活动

C 感受器为肌梭 D 效应器主要为慢肌纤维成分 E 为单突触反射

40、“旁分泌”就是()

-
- A 通过血液的传递 B 激素通过扩散而作用于邻近细胞
C 激素通过血液以外途径作用于远隔的靶细胞 D 在突触连接局部释放化学物质
E 在内分泌腺间质细胞分泌的激素
- 41、与婴儿神经系统发育密切相关的激素是()
A 生长素 B ACTH C 甲状腺素 D 胰岛素 E 催乳素
- 42、O₂ 和 CO₂ 进出细胞膜是通过()
A 单纯扩散 B 易化扩散 C 主动转运 D 入胞作用 E 出胞作用
- 43、对胸骨角叙述不正确的是()
A 两侧分别与左右第 3 肋软骨连接 B 是计数肋骨顺序的主要标志
C 是计数肋间隙顺序的主要标志 D 标志支气管分叉 E 相当于第 4 胸椎下缘水平
- 44、下述情况可出现异常支气管呼吸音，但除外哪项?()
A 大叶肺炎实变期 B 肺脓肿 C 空洞型肺结核 D 气胸 E 胸腔积液
- 45、语音震颤减弱或消失见于下列疾病，但哪项除外?()
A 肺气肿 B 阻塞性肺不张 C 气胸 D 肺梗 E 胸壁皮下气肿
- 46、恶性肿瘤淋巴结转移之淋巴结特点正确的是()
A 柔软、有压痛 B 表面光滑无粘连 C 质地坚硬或有橡皮样感
D 肿大到一定程度即可缩小、消退 E 只发生在颈部血管周围
- 47、下列有关脉压减小的叙述正确的是()
A 系指脉压 ≤ 30 mmHg B 为上下肢血压差异所致
C 常伴有交替脉 D 主要见于主动脉瓣狭窄 E 也可见于动静脉瘘
- 48、用搔弹法可检出少至多少毫升腹腔积液?()
A 50 mL B 80 mL C 100 mL D 110 mL E 120 mL
- 49、室性奔马律提示()
A 左室充盈压下降 B 左房压下降 C 肺动脉楔压升高 D 心脏指数升高 E 左室射血分数升高
- 50、下列均为腹部触诊的正确方法，但不包括()
A 边触诊边观察被检查者的表情 B 一律遵循自左下腹开始逆时针方向触诊原则
C 触诊脾脏时可向右侧卧位 D 触诊肝脏时应配合患者呼吸 E 被检查者两腿屈曲

51、咳嗽伴杵状指不常见于下列哪种疾病?()

A 支气管肺炎 B 支气管扩张 C 肺脓肿 D 支气管肺癌 E 脓胸

52、下述哪种情况不出现异常支气管呼吸音?()

A 大叶肺炎实变期 B 肺脓肿 C 空洞型肺结核 D 气胸 E 胸腔积液

53、男性，58岁，突发恶心、头晕、呕鲜红色血液约1000 mL。既往有长期大量饮酒史。查体：BP 85/60 mmHg，P110次/min，面色苍白，神志淡漠，巩膜无黄染，心肺未见异常，腹软，无压痛，肝脾未触及，移动性浊音阴性，下列哪项支持肝硬化食管静脉曲张破裂出血的诊断?()

A 服用药物史 B 伴腹痛 C 伴寒战、高热 D 呕血中有凝血块 E 血中带痰

54、二尖瓣狭窄最早出现的症状是()

A 咯血 B 水肿 C 头昏 D 发绀 E 呼吸困难

55、关于影响疼痛的因素下列哪项描述是错误的?()

A 心肌梗死的发作多无诱因 B 体力负荷加重为心绞痛的诱发因素

C 反流性食管炎的胸骨后灼痛，饥饿时出 D 肋骨骨折在深呼吸及上臂运动时加重

E 胸膜炎的胸痛，在咳嗽与深呼吸时加重

56、咳嗽伴哮鸣音不常见于()

A 支气管哮喘 B 支气管异物 C 急性左心衰竭 D 肺脓肿 E 肿瘤压迫气管

57、幽门梗阻呕吐的特点是()

A 餐后即刻呕吐 B 呕吐物有宿食味 C 呕吐物含多量胆汁 D 晨起呕吐 E 喷射状呕吐

58、便血伴腹部肿块可见于()

A 结肠癌 B 痢疾 C 直肠炎 D 溃疡性结肠炎 E 急性出血性坏死性肠炎

59、属于肾实质性少尿的是()

A 腹泻、呕吐等导致的缺水、少尿 B 肝肾综合征时的少尿 C 使用 α -肾上腺类药物引起的少尿 D 急性肾小球肾炎时的少尿 E 心功能不全引起的少尿

60、晕厥前有心悸感，应考虑()

A 肥厚性心肌病 B 严重心律失常 C 运动后晕厥 D 咳嗽晕厥 E 排尿晕厥

61、意识障碍伴颈项强直，见于()

A 巴比妥类中毒 B 各种原因的休克 C 脑膜炎 D 吗啡中毒 E 一氧化碳中毒

62、血小板减少不出现在()

A 脾功能亢进 B DIC C 再生障碍性贫血 D 急性失血 E 急性白血病

63、血糖正常而糖尿阳性又称()

A 应激性糖尿 B 肾性糖尿 C 皮质醇增多症 D 糖尿病 E 一过性糖尿

64、下列哪项属不正常的心电图改变?()

A 在 V1、V2 导联 ST 段正常可上升 0.2 mV B 在 V3 导联 ST 段正常可上升 0.2 mV

C 在 V4~V6 导联 ST 段正常可上升 0.04 mV D 在 II、III、avF 导联 ST 段正常可上升 0.04 mV E 在 II、III、avF 导联 ST 段正常可上升 0.04 mV

65、完全左束支传导阻滞引起的第二心音分裂属于()

A 生理性分裂 B 通常分裂 C 反常分裂 D 固定分裂 E 以上都不对

66、低钾血症时表现为()

A 膝腱反射亢进 B 谵妄、躁动，精神兴奋 C 腹胀，肠鸣音亢进

D 心脏于舒张期停搏 E 心电图 T 波改变及 U 波的出现

67、代谢性酸中毒时()

A 呼吸快而浅 B 呼吸慢而浅 C 尿液呈碱性 D 钾离子进入细胞内 E 呼吸深而快

68、酸碱平衡的调节主要()

A 以呼吸系统为主 B 以泌尿系统为主 C 以血液缓冲系统为主 D 靠以上三者共同作用

E 靠抗利尿激素与醛固酮的影响

69、输血最常见的并发症为()

A 过敏反应 B 溶血反应 C 细菌污染反应 D 心衰 E 发热反应

70、误输异型血可发生()

A 过敏反应 B 发热反应 C 细菌污染反应 D 血液凝集反应 E 溶血反应

参考答案:

1、B 2、A 3、A 4、E 5、C 6、D 7、D 8、C 9、A 10、C

11C、12C、13C、14D、15C

16A、17A、18C、19D、20C

21B、22B、23D、24C、25A

26A、27C、28D、29E、30E

31C、32E、33E、34A、35A

36D、37A、38B、39E、40B

41C、42A、43A、44D、45D

46C、47D、48E、49C、50B

51A、52D、53D、54E、55C

56D、57B、58A、59D、60B

61C、62D、63B、64C、65C

66E、67E、68D、69E、70E